

БОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Института Споровых Растений

ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Р. С. Ф. С. Р.

под редакцией Главного Ботаника А. А. ЕЛЕНКИНА.

Том II. Вып. 1—12.

1923.



NOTULAE SYSTEMATICAE

ex Instituto Cryptogamico

HORTI BOTANICI PETROPOLITANI,

redactae a Botanico Primario

A. A. ELENKIN.

Tomus II. Fasc. 1—12.

PETROPOLIS.

1923.

Notulae systematicae ex Instituto Cryptogamico Horti Botanici Petropolitani.

БОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Института Споровых Растений Главного Ботанического Сада Р. С. Ф. С. Р.,
издаваемые под редакцией Главного Ботаника *А. А. Еленкина*.

1923.

Т. II. — Выпуск 2.

28 февраля.

L. A. Lebedjeva.

Fungi novi in Horto Botanico Petropolitano annis 1921—22 collecti. IV.

Phoma onocleae nov. sp. Lebed.

Pycnidiis sparsis, nervulos erumpentibus, rotundatis vel oblongo-ellipsoideis, contextu parenchymatico obscure-brunneo, 150—250 μ . diam. Sporulis ellipsoideis utrinque rotundatis, biguttulatis, hyalinis, 6—8 μ . long. et 2,5—3 μ . lat.

Hab. In foliis emortuis *Onocleae Struthiopteris* Hoffm., 21 X 1922, in Horto Botanico Petropolitano, leg. L. Lebedjeva.

Phomopsis hakeae Lebed. nov. sp.

Maculis amphigenis, pallido-brunneis, majoribus, margine angusto fusco cinctis; pycnidiis epiphyllis globulosis sparsis, punctiformibus, poro lato instructis, contextu fusco-brunneo, grosse pseudoparenchymatico indistincte plurilocularibus, 200—300 μ . diam.; sporulis fuscoideis, utrinque parum attenuatis, rectis, saepe intus minute granulosis et bi vel pluriguttulatis, hyalinis, 10—12 μ . long. et 4 μ . lat. sporophoris cylindraceutis, apice angustis, rectis, hyalinis, 15—20 μ . long. et 3 μ . lat.

Hab. In foliis vivis *Hakeae acicularis* Knight., in calidariis Horti Botanici Petropolitani 4/IX 22, leg. L. Lebedjeva.

Phomopsis Elenkinii Lebed. nov. sp.

Maculis amphigenis, irregularibus, griseo-albis, folii majorem partem occupantibus, margine angusto castaneo-fusco cinctis; pycnidiis epiphyllis, sparsis, globoso-applanatis, nonnunquam lenticularibus vel irregularibus, subepidermicis, dein erumpentibus, nigris, contextu pseudoparenchymatico fusco-brunneo, ostiolo irregulari perforatis, uni vel indistincte bilocularibus, 150—250 μ . diam.; sporulis tereti-oblongis, basi angustis biguttulatis, hyalinis, 7—9 μ . long. et 2—3 μ . lat.; sporophoris, filiformibus, hyalinis, usque 15—25 μ . long. et 1,5 μ . lat., basi subfasciculatis.

Hab. In foliis vivis *Galipeae Fischeri* Rgl., in calidariis Horti Botanici Petropolitani, 4/XI 22, leg. L. Lebedjeva.
