

ЛЕКТОТИПИФИКАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВЫХ
И ВНУТРИВИДОВЫХ НАЗВАНИЙ В РОДЕ EUPHORBIA L.
(EUPHORBIACEAE)

LECTOTYPIFICATIO NOMINUM SPECIERUM ET TAXORUM
INTRASPECIFICORUM NONNULLORUM IN GENERE
EUPHORBIA L. (EUPHORBIACEAE)

Ниже публикуется выбор лектотипов для ряда названий таксонов рода *Euphorbia* L., в том числе и относимых в настоящее время в большинстве работ к синонимам. Все типифицируемые названия приведены в соответствии с их первоначальным написанием.

Euphorbia altissima Boiss., 1844, Diagn. Pl. Orient. Nov. 5: 52.

Описан из Малой Азии («ad rivulos circa Denisleh et Laodiceam in Phrygia australi»). *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Denisleh, VI 1842, [Boissier]» (G-BOISS!).

E. aspera Vieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 377.

Описан с Сев. Кавказа («in nemorosis ad rivum Podkumok, circa fortalitiu Georgopolitanum»). *Lectotypus* (Byalt, in sched.; Geltman, hic designatus): «Ex Caucaso demisiore Rutheno, a. 1800» (LE — Vieb!).

E. borodinii Sambuk, 1928, Изв. АН СССР, сер. 7: 45.

Описан из Архангельской обл. («Prov. Archangelsk, distr. Petschora, Ustj-Cilma»). *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Архангельская обл., Печорский у., с. Усть-Цильма, луга в пойме Печоры против станции, 3-я гряда, низкий уровень, 31 VII 1926, Ф. Самбук» (LE!).

В протологе нет точного указания даты сбора. В LE имеется 2 экземпляра из locus classicus, несколько отличающихся датами. Один из них выбран как лектотип.

E. cilicica Boiss., 1859, Diagn. Pl. Orient. Nov., ser. 2, 4: 88.

Описан из Малой Азии («in Tauro Cilicio ad Gülek Boghas et in collibus incultis circa Caesarum Cappadociae»). *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Gulek-Boghas, á 10 lieues an nord de Tarrous, 22 VII 1855, N 731, Balansa» (G-BOISS!).

E. gerardiana var. *hohenackeri* Boiss., 1862, in DC., Prodr. 15, 2: 167.

Описан из Европы и с Кавказа («in Georgia Cauc. ..., Hungaria»). *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Ad margines Georg. Cauc., VI 1836, R. F. Hohenacker» (G-BOISS!).

E. graeca Boiss. et Sprun., 1844, in Boiss., Diagn. Pl. Orient. Nov., ser. 1, 5: 53.

Описан из Греции и Малой Азии («in lapidosis montosis Graeciae et Asiae Minoris, in monte Arachnaeon Argolidis et prope Naupliam, in Hymetto, montibus Beotiae, Asiae Minori»). *Lectotypus* (Benedi et Vicens, in sched., 1999; Geltman, hic designatus): «Hymetto, Spruner» (G-BOISS!).

E. leptocaula Boiss. var. *bogdanii* Litv., 1922, в Списке раст. Герб. Русск. фл. 8: 101 (№ 2586с).

Описан с востока Европейской России. *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Самарская губ., Новоузенский у., по глинистым склонам бл. (бывшей) Костычевской опытной станции у с. Валуyki, 15 V 1900, В. Богдан» (LE!, cum iso.).

E. muricata Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 378.

Описан из Закавказья («in Iberiae sylvis»). *Lectotypus* (Byalt, in sched.; Geltman, hic designatus): «Ex Iberuae, 1800, Steven» (LE — Bieb!).

E. petrophila var. *colchica* Litv. 1898, Тр. Петерб. бот. сада 14, 2: 299.

Описан из Зап. Закавказья. *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «Черноморский окр., нижнее течение р. Псезуапсе, на каменистом склоне, 21 VI 1895, Д. Литвинов» (LE!, cum iso.)

E. procera Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 378.

Описан с Сев. Кавказа («in virgultis ag flumium Terek, inter Kislar et Mosdok»). *Lectotypus* (Geltman, hic designatus): «ex Tauria et Caucaso demissiora» (LE!).

В LE нет экземпляров с этикеткой, более или менее точно соответствующей протологу. В качестве лектотипа выбран единственный экземпляр из коллекции Биберштейна, собранный до выхода первого тома его «Крымско-кавказской флоры».

E. thamnoides Boiss., 1860, Cent. Euphorb.: 33. — *E. dumosa* Boiss., 1853, Diagn. Pl. Orient. Nov. 12: 110, nom. illeg.

Описан из Сирии («in collibus calidis Syriae littoralis circa Berythum et Pripolim frequens»). *Lectotypus* (Benedi et Vicens, in sched.; Geltman, hic designatus): «Syria, Tripoli, V–VII 1846, E. Boissier» (G-BOISS!).

E. tinctoria Boiss. et Huet, 1862, in DC., Prodr. 15, 2: 166.

Описан из Юго-Западной Азии («in Anatolia bor. prope Beybazar, Angora, Caria bor., Lycia, Armenia, Persia bor. et austro-occid. ad Kirrind»). Лектотипус (Geltman, hic designatus): «Elmali, 9 VII 1860, [Bourgeau]» (G-BOISS!).

E. uralensis Fisch. ex Link, I–VI 1822, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 14.

Описан с Урала («in montibus Uralensis»). Лектотипус (Geltman, hic designatus): «Ural, Helm» (LE!).

Ф. Б. Фишер активно рассылал образцы и семена своего вида в различные гербарии и ботанические сады, но не сделал формального описания вида. Название *E. uralensis* Fisch. было обнародовано в один и тот же год Линком (Link, 1822) и Шренком (Schrank, 1822), но Линком, судя по всему, несколько раньше. Типом *E. uralensis* Fisch. ex Link логично было бы считать материал из гербария Линка, но он, скорее всего, не сохранился. Поэтому как лектотип был выбран образец из личного гербария Фишера (LE).

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 04-04-48758).

Литература

Link H. F. Enumeratio plantarum horti regii botanici berolinensis alteras. Berolini, 1822. Pars 2. 478 p.

Schrank R. Bemerkungen über einige selterne Pflanzen des k. botanischen Gartens zu München// Denkschr. Bayer. Bot. Ges. Regensb. 1822. Bd 2. S. 21–72.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: geltman@binran.ru