

НОВЫЕ ПОДСЕКЦИИ СЕКЦИИ SYLLINUM GRISEB.
РОДА LINUM L. (LINACEAE)

SECTIONIS SYLLINUM GRISEB. GENERIS LINUM L.
(LINACEAE) SUBSECTIONES NOVAE

В настоящей статье в секции *Syllinum* Griseb. рода *Linum* L. впервые выделяются подсекции. Виды, включенные нами в описываемые ниже подсекции, были объединены С. В. Юзепчуком (1949) в ряды, не имеющие латинских описаний. Поэтому ряды Юзепчука не являются действительно обнародованными и их названия не могут быть использованы в качестве базионимов для приводимых здесь подсекций.

Sect. *Syllinum* Griseb., 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 115; Ockendon a. Walters, 1968, in Fl. Europ. 2: 206; Т. В. Егорова, 1996, во Фл. Вост. Евр. 9: 351; она же, 2000, Бот. журн. 85, 7: 166. — *Linum* L. subgen. *Syllinum* (Griseb.) Planch. ser. *Limoniopsis* Planch., 1847, Lond. Journ. Bot. 6: 598. — *L.* sect. *Limoniopsis* (Planch.) Juz., 1949, во Фл. СССР 14: 130; Т. В. Егорова, 1973, во Фл. Арм. 6: 194. — Многолетние травы или полукустарнички, часто с розетками листьев, сохраняющимися ко времени цветения генеративных побегов; стебли с очень узкими крыльями, низбегающими от основания листьев. Листья очередные, с 2 стипулярными железками при основании, голые или опушенные. Цветоножки очень короткие. Цветки гетеростильные. Чашелистики по краям реснитчатые, с одной килевидно выступающей жилкой. Лепестки желтые. Рыльца коротколинейные или эллиптические. Коробочки шаровидные, (3) 3.5–6 (7–8) мм дл., (3) 3.5–5 (6.5–7) мм шир., на поперечном срезе округлые.

Lectotypus (Егорова, 1996: 351): *L. flavum* L.

Около 15 видов, распространенных в центральных и южных районах Западной и Восточной Европы, в Средиземноморье, на Кавказе и в Юго-Западной Азии.

Sect. *Syllinum* subsect. 1. **Flava** Svetlova subsect. nova. — *Linum* subgen. *Syllinum* (Griseb.) Planch. ser. *Limoniopsis* Planch., 1847, Lond. Journ. Bot. 6: 598, p. p. — *L.* sect. *Limoniopsis* (Planch.) Juz. ser. *Euflava* Juz., 1949, во Фл. СССР 14: 136, nom. inval., descr. ross. — *Plantae perennes, sine foliorum rosulis permanentibus ad anthesin ramorum fertile. Caules glabri, folia et sepala glabra.*

Т у р у с : *L. flavum* L.

Многолетние травы, без розеток листьев, сохраняющихся ко времени цветения генеративных побегов. Стебли, листья и чашелистики голые.

Т и п : *L. flavum* L.

В подсекцию входит 1 вид и 2 подвида: *L. flavum* L.: *L. flavum* subsp. *flavum*, *L. flavum* subsp. *basarabicum* (Savul. et Rayss) Svetlova.

Sect. ***Syllinum*** subsect. 2. **Taurica** Svetlova subsect. nova. — *Linum* L. subgen. *Syllinum* (Griseb.) Planch. ser. *Limoniopsis* Planch., 1847, Lond. Journ. Bot. 6: 598, p. p. — *L. sect. Limoniopsis* (Planch.) Juz. ser. *Flava* Juz., 1949, во Фл. СССР 14: 130, p. p., nom. inval., descr. ross. — Suffruticuli cum foliorum rosulis permanentibus ad anthesin ramorum fertilium, rarius sine rosulis. Caules glabri, folia et sepala glabra, rarius omnes pubescentes.

Т у р у с : *L. tauricum* Willd.

Полукустарнички с розетками листьев, сохраняющимися ко времени цветения генеративных побегов, реже без розеток. Стебли, листья и чашелистики голые, реже опушенные.

Т и п : *L. tauricum* Willd.

В подсекцию входят 6 видов и 3 подвида: *L. linearifolium* (Jávorka) Juz., *L. tauricum* Willd., *L. mucronatum* subsp. *armenum* (Bordz.) P. H. Davis, *L. pallasianum* Schult., *L. ucranicum* (Griseb. ex Planch.) Czern.: *L. ucranicum* subsp. *ucranicum*, *L. ucranicum* subsp. *uralense* (Juz.) T. V. Egorova, *L. czernjajevii* Klok.

Литература

- Егорова Т. В. Сем. *Linaceae* DC. ex S. F. Gray — Льновые // Флора Восточной Европы. СПб., 1996. Т. 9. С. 364–360.
- Юзепчук С. В. Сем. Льновые — *Linaceae* Dumort. // Флора СССР. М.; Л., 1949. Т. 14. С. 84–146.
- Rogers C. M. *Linaceae* S. F. Gray // North American Flora. New York., 1984. Ser. 2. Pt 12. 58 p.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: aas1980@mail.ru