

**ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ТАКСОНОВ
ИЗ СЕМЕЙСТВА ASTERACEAE, ХРАНЯЩИЕСЯ
В ГЕРБАРИИ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ В. Л. КОМАРОВА (LE)**

**SPECIMINA TYPICA TAXORUM ASIAE ORIENTALIS
E FAMILIA ASTERACEAE IN HERBARIO INSTITUTI
BOTANICI NOMINE V. L. KOMAROVII (LE) CONSERVATA**

В данной статье приводятся сведения о типовых образцах 128 таксонов из 45 родов семейства *Asteraceae*, описанных с территории Китая, а также типы таксонов с п-ова Корея и Японии, не вошедшие в «Каталог типовых образцов высших сосудистых растений Гербария БИН РАН (LE) Восточной Азии, часть 1 (Япония и Корея)» (Каталог..., 2004). Типовой материал представлен большей частью сборами известных ботаников и коллекторов: А. А. Бунге, П. Е. Кирилова, Г. Н. Потанина, В. Л. Комарова, А. Henry, А. David, J. M. Delavay, Н. F. Hance, G. Forrest, F. E. Younghusband, W. Hancock, E. Faber, T. Sampson, J. F. Rock, Н. Handel-Mazetti и др.

В приведенном ниже перечне типовых образцов названия типифицируемых таксонов даны в алфавитном порядке. Для каждого таксона приведены номенклатурная цитата, категория типа, полный текст гербарной этикетки, сведения о местонахождении типов в других Гербариях и цитата из протолога. В необходимых случаях даются комментарии. Принимаемое в настоящее время название растения дано в круглых скобках, дополнительные сведения — в квадратных.

В ряде случаев образцы, этикетки которых соответствуют единственному процитированному в протологе экземпляру, отнесены к категории синтипа, а не изотипа. Это объясняется тем, что мы не имеем сведений о количестве гербарных листов (дублетов), возможно хранящихся в других гербариях, а также не знаем, были ли какие-либо из этих экземпляров обозначены авторами видов как голотипы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 02-04-48479 и № 06-04-48299).

1. *Acarna chinensis* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 36. (= *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. fide C. Shih, 1987, in Fl. Reip. Pop. Sin. 78, 1: 25).

Syntypus: «China. [fl. et fr.], 1831, Bunge» (LE).

По протологу: «in montosis Zui-wey-schan et Guan-gou ad murum magnum».

2. *Ainsliaea pertioides* Franch., 1888, Journ. Bot. (Paris) 2: 70, pl. 3.

Syntypus: «Chine, prov. Yun-nan, in silva Ta-long-tan, prope Ta-pin-tze, alt. 1800 m. 20 I 1887, [fl.], N 2313, Delavay» (LE).

По протологу: «In dumetis, solo calcareo, ad fauces Kien-min-keou prope Mo-so-yn, 23 jan. 1885 (Delavay, N 1218); in umbrosis silvarum ad Pee-tsaio-lo, supra Mo-so-yn, 9 april 1886; in silvis ad Ta-long-tan prope Tapin-tze, alt. 1800 m., 20 jan. 1887 (Delavay, N 2313)».

3. *A. ramosa* Hemsl. ex F. B. Forbes et Hemsl., 1888, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 23: 471.

Syntypus: «China, Ichang, Nan-T'ö and mountains to northward. III 1888, [fl.], N 4422, A. Henry» (LE).

По протологу: «Hupeh: Nanto and mountains to the northward (A. Henry)».

4. *A. scabrida* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 510. (= *A. yunnanensis* Franch. fide Y. C. Tseng, 1996, in Fl. Reip. Pop. Sin. 79: 44).

Syntypi (2): «China, Yunnan, Mi-lê district. [fl.], N 9851, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: mountain-slopes at 6000 ft. near Mengtze, Hancock, 8; in woods at Mengtze, A. Henry, 9851».

Примечание. Округ Mi-lê находится в окрестностях Mengtze в провинции Юньнань, где А. Henry собрал обширную коллекцию растений в 1896 и 1898 гг. (Bretschneider, 1898).

5. *Ajania junnanica* Poljak., 1955, Бот. мат. (Ленинград) 17: 424.

Но л о т у п у с : «Yunnan, paturage Pe-long-hin, 3200 m. 1909–1911, [fl.], N 7319, Maire» (LE).

По протологу: «China prov. Junnan, pascua Pe-long-chin, alt. 3200 m, XI 1911, Maire».

6. *Anaphalis desertii* Drumm., 1910, Kew Bull.: 76.

Syntypus: «Lonok. 28 VII – 8 VIII 1903, [fl.], N 190, F. E. Younghusband» (LE).

По протологу: «India. Eastern Himalaya: Lonok, Younghusband. Tibet. Near Gyantze, Stewart».

7. *A. hancockii* Maxim., 1882, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 27: 478.

Л е к т о т у п у с (Imkhanitskaya, in sched., Illarionova, hoc loco): «China, in m. Siao-wu-tai-shan a Pekin ad W. 1876, [fl.], Hancock» (LE).

Syntyp: LE, Центр. Азия (см.: Имханицкая, 2000).

По протологу: «China boreali: in alpe Siao-wu-tai-shan ditionis Pekinensis (Hancock), Kansu occidentali alpina, alt. 9–12 mill. ped. s. m. (Przewalski, 1872, 1880); in jugo altissimo Nan-shan inter Mongoliam et Zaidam finitimo (idem, 1879)».

8. *Artemisia aurata* Kom., 1901, Тр. Петерб. бот. сада 18: 422.

Syntypus: «Mandschuria, Prov. Kirinensis, гора Сiao-Лаба-Лин, скалы. 26 VIII 1896, [цв.], В. Комаров» (LE).

Syntyp (2): LE, п-ов Корея (см.: Илларионова, 2004).

По протологу: «In rupibus Manshuriae nec non Koreae septentrionalis. Legi: 1). In monte Laba-lazsa-lin. Manshuriae provincia nec non districtus Kirin, vallis fl. Labacho fl. Sungari influentis. 26 VIII 1896. 2). In rupibus prope Tadin-don (jam florens) secus rivulum fluvii Jalu-dsian decursum superiorem influentem, Koreae septentr. provincia Keng-son. 22 VI 1897. 3). In valle fl. Jalu-dsian prope oppidulum Chudshu-ubi. Koreae septentr. provincia Kenge. 15 VIII 1897».

9. *A. eriopoda* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 37.

Syntypus: «Ch. bor. [fl.], Bunge, herb. Ledebour» (LE).

По протологу: «hab. in montosis Pan-schan, Guan-gou etc.».

10. *A. igniaria* Maxim., 1859, Мém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 161, in nota.

Но л о т у п у s : «China, в Пекине близ заборов и по пустырям. [fl.], Hb. Fischer» (LE).

По протологу: «extra urbem Pekinum, ad sepes et in ruderatis (Rel. Fisch. in Hb. Petrop.)».

11. *A. intricata* Franch., 1884, Pl. David. 1: 170. (= *Elachanthemum intricatum* (Franch.) Ling et Y. R. Ling fide C. Shih et G. X. Fu, 1983, in Fl. Reip. Pop. Sin. 76, 1: 97).

Syntypus: «Mongolie orientale, Sartchy, sur les rochers. Avril, 1866, [fl.], N 2962, A. David» (LE).

По протологу: «Mongolie: sur les rochers, autour de Sartchy et a Che-kouen, dans le torrent, n. 2962, Avril 1866».

12. *Aster ageratoides* Turcz., 1837, Bull. Soc. Nat. Moscou 10, 7: 154.

Syntypus: «Pekin. [fl.], Kirilow, herb. Fischer» (LE).

По протологу: «China borealis, Kirilow».

13. *A. alatipes* Hemsl. ex F. B. Forbes et Hemsl., 1888, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 23: 411.

Syntypus: «China, Nan-T'o and mountains to northward, Ichang. V 1888, [veg.], N 4496, A. Henry» (LE).

По протологу: «Hupeh: Nanto and mountains to the northward (A. Henry, 4496)».

14. *A. fauriei* Lévl. et Vaniot, 1909, Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. (Le Mans) 20: 139. (= *A. feddei* Lévl. et Vaniot, 1910, Feddes Repert. 8: 168).

Syntypus: «Corea, in rupibus littoris Quelpaert. Oct. 1906, [fl.], N 1118, U. Faurie» (LE).

По протологу: «Quelpaert in rupibus littoris, oct. 1906; n. 1118.»

15. *A. henryi* Hemsl. ex F. B. Forbes et Hemsl., 1888, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 23: 411. (= *A. moupinsensis* (Franch.) Hand.-Mazz., 1937, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13: 613).

Syntypi: «China, Ichang. Recd. III 1886, [fl.], N 133, A. Henry»; «China, Ichang and immediate neighbourhood. II 1887, [fl. et fr.], N 3262, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Hupeh: Ichang and immediate neighbourhood (A. Henry 133, 3262)».

Примечание. Синтипы расположены на одном гербарном листе.

16. *A. mongolicus* Franch., 1884, Pl. David. 1: 161. (= *Kalimeris mongolica* (Franch.) Kitam., 1937, Acta Phytotax. Geobot. 6: 21).

Syntypus: «Chine (Mongolie orientale), Géhol, sur le bord des ruisseaux. Juillet 1864, [fl.], N 1995, A. David» (LE).

По протологу: «Mongolie: Géhol au bord des ruisseaux (n. 1995, 2189). Fl. Jul. 1864».

17. *A. nigromontana* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 501.

Syntypus: «China, Yunnan, Mengtze, N. mts. 8000'. [fl.], N 11302, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: obtained by Henry's native collector Ho on the summit of Great Black Mountain at 8000 ft. near Mengtze, A. Henry 11302».

18. *Bidens minuscula* Lévl. et Vaniot, 1910, Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. (Le Mans) 20: 3.

Syntypus: «Corea, Quelpaert, in herbis humidis Hallaisan, 1000 m. 18 IX 1908, [fl.], N 1031, T. Taquet» (LE).

По протологу: «Corée: Quelpaert, lieux herbeux humides d'Hallaisan; 1000 m., plante gazonnante, 18 sept. 1908 (Taquet, 1031)».

19. *Blumea amethystina* Hance, 1868, Journ. Bot. (London) 6: 173. (= *B. fistulosa* (Roxb.) Kurz. fide C. C. Chang et Y. Q. Tseng, 1979, in Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 35).

Syntypus: China, «ad fauces Shiu-hing, secus fl. West River, prov. Cantoniensis. 8 II 1867, [fl.], N 12815, T. Sampson» (LE).

По протологу: «Ad fauces Shiu-hing, secus fl. West River, prov. Cantoniensis, Febr. 1866-7, collegit T. Sampson (Exsicc. n. 12815)».

20. *B. gracilis* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 502. (= *B. tenuifolia* C. Y. Wu, 1979, in Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 44).

Syntypus: «China, Yunnan, Szemao, 4500'. [fl.], N 12526, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: in wet places in the open parts of a river-ravine near Szemao, A. Henry, 12526».

21. *Cacalia aconitifolia* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 37. (= *Syneilesis aconitifolia* (Bunge) Maxim., 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 165).

Л е к т о т ы п у с (Илларионова, hoc loco): «China bor. [fl.], 1831, Bunge, herb. Meyer» (LE).

Syntypi: «Ch. bor. [fl., 1831], Bunge, herb. Ledebour»; «China bor. [fl., 1831], Bunge, herb. Fischer»; «China. [fl.], 1831, Bunge» — (LE).

По протологу: «in montosis umbrosis Zui-wey-schan».

22. *C. crepidifolia* Nakai, 1915, Bot. Mag. Tokyo 29: 12.

Syntypus: Japan, «in silvis Bonin. [fl.], N 34, R. Yatabe et T. Uchiyama» (LE).

По протологу: «Crepis integra Maxim. in litt. n. 34. Hab. in silvis Bonin (R. Yatabe et T. Uchiyama); ibidem IV.1914 (S. Nishimura)».

Примечание: Процитированная этикетка написана В. Л. Комаровым, оригинальная этикетка данного сбора, которая была прикреплена к растению, содержит только: «Bonin, № 34».

23. *C. firma* Kom., 1901, Тр. Петерб. бот. сада 18: 420. (= *Parasenecio firmus* (Kom.) Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 26).

Syntypus: «Манджурия. В пихтовнике на базальтовом плато правого берега р. Ялу между Нараном и Худжу. 14 VIII 1897, [цв.], Комаров» (LE).

Syntypus: LE, п-ов Корея (см.: Илларионова, 2004).

По протологу: «In silvis acerosis et mixtis in montibus secus decursum medium fluvii Jalu-dsian ad fines Koreae nec non Manshuriae copiose crescit. Legi: 1). Infra ostium fluvii Czan-dschin-gan in silvis secus ripam dextram fl. Jalu-dsian. 13 VIII 1897. 2). In silvis ad trajectum Undon-ien. Koreae septentrionalis provincia Kenge, districtus Chu-czan. 23 VIII 1897».

24. *Carpesium eximium* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 58. (= *C. macrocephalum* Franch. et Sav. fide F. H. Chen et C. M. Hu, 1979, in Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 295).

Syntyp: «China borealis: prov. Szetschuan. Дол. р. Хонтон выше моста Чжанчжа-коу. 13 VIII 1885, [fl.], Potanin»; «*ibid.*, Дер. У-пин. 6 VII 1885, [post fr.], Potanin» — (LE).

По протологу: «in Chinae provincia Szetshuan ad ripas fluvii Honton supra pontem Dshau-dshi-kou nec non inter provincias Kansu et Szetshuan prope pagum Wuping. Julio et Augusto mensibus anni 1885 legit cl. Potanin».

25. *C. faberi* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 65.

Но́ло́тупу́с: China, «Omei, Szechwan. [fl.], N 396, E. Faber, sub «*C. trachelifolium* Less.» (LE).

По протологу: «in Chinae, a cl. Faber prope Omei provincia Szetshuan lectus sub numero 396 et sub nomine *C. trachelifolii* Lessing».

26. *C. humile* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 70.

Сы́нту́пус: «China occidentalis, prov. Szechuan, выше дер. Чжунгу, сев. дол. у г. Цзян-лу. 16 VII 1893, [fl.], G. N. Potanin» (LE).

Лес́тотупу́с (Grubov, in Popova, 2000): LE.

По протологу: «In Chinae occidentalis regione Tangut. Ad ripas fluvii Mudshik-ho ad meridiem versus ab oppido Hui-tui altitudine 9–9500' Junio mense anni 1880 cl. Przewalsky decerpit et sub numero 266 cum herbario horti Petropolitani communicavit; nec non in provincia Szetshuan prope oppidum Tatsien-lu supra pagum Dshun-ga 16 VIII 1893 (Potanin)».

27. *C. taquetii* Lévl., 1910, Feddes Repert. 8: 170.

Сы́нту́пус: «Corea, Quelpaert, in sylvis Yengsil, Hallaisan, 1000 m. 17 VIII 1908, [fl.], N 975, T. Taquet» (LE).

По протологу: «Corea: Quelpaert, in silvis Hallaisan; Yengsil, 1000 m., 17 аоыт. 1908 (Taquet, 975)».

28. *C. velutinum* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 73.

Но́ло́тупу́с: «China borealis: Szetschuan septentrionali, между Сюопу и Итан. 18 VIII 1885, [fl.], G.N. Potanin» (LE).

По протологу: «habitat in Chinae provincia Szetshuan, inter Siao-pu et Itang Augusto mense anni 1885 cl. Potanin detexit».

29. *Chrysanthemum nematolobum* Hand.-Mazz., 1938, Acta Horti Gotoburg. 12: 271. (= *Ajania nematoloba* (Hand.-Mazz.) Ling et Shih, 1980, Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 6: 16).

Исо́тупу́с: «China, Kansu, between Choni and Lanchow, alt. 2600 to 3000 m. 19–21 IX 1923, [fl.], N 1046, R. C. Ching» (LE).

Ту́пус: US.

По протологу: «Kansu: 20 km ad merid. ab urbe Lan-chou, 2600–3000 m, 20 IX 1923 (Ching 1046)».

30. *Cineraria subdentata* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 39. (= *Tephrosieris subdentata* (Bunge) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8: 174).

Syntypus: «China. 1831, [fl.], Bunge» (LE).

По протологу: «Hab. in humidis prope Tan-shan».

31. *Cirsium lyratum* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 36. (= *Hemistepta lyrata* (Bunge) Bunge, 1833, Dorp. Jahrb. Litt. 1: 221).

Syntypi: «China. 1831, [fl.], Bunge»; «China boreal. [fl.], Bunge et Karelin» — (LE).

Syntypi (3): «China bor. [fl., 1831], Bunge» (LE).

По протологу: «in montosis et pratensibus prope Lun-züan-ssy, Tan-schan».

32. *C. segetum* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 36.

Syntypi: «Ch. b. [fl.], Bunge, herb. Ledebour»; «China, Pek., cult. (в Пекине по полям между посевами). [fl.], Hb. Fisch.» — (LE).

По протологу: «Hab. in cultis arvensibus».

Примечание. Растения смонтированы на одном гербарном листе.

33. *Cnicus henryi* Franch., 1897, Journ. Bot. (Paris) 11: 21. (= *Cirsium henryi* (Franch.) Diels, 1901, Bot. Jahrb. 29: 627).

Syntypus: «China, prov. Hupeh. [fl.], N 6764, A. Henry, Recd. III 1889» (LE).

По протологу: «China centralis; prov. Hupeh, circa Ichang (Dr. Henry, n. 6764)».

34. *Conyza pinnatifida* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 502. (= *C. blinii* Lévl. fide Y. L. Chen, 1985, in Fl. Reip. Pop. Sin. 74: 341).

Syntypi: «China, Yunnan, Mengtze, grass mts. 6000'. [fl. et fr.], N 9982 A, A. Henry»; «ibid., Szemao, mts. 4800'. [fl.], N 12176, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Yunnan: common on the grass mountains near Mengtze at 6000 ft., A. Henry, 9982 A, Szemao, A. Henry, 12176, and at Yunnanfu, Ducloux, 128».

35. *Cremanthodium potaninii* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 150.

Н о л о т ы п у с : «China borealis: prov. Kansu orientali, cacumine montis Tschagola. 11 VII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in China provincia Kan-su orientali prope pagum Tschagola. Julio mense anni 1885 legit cl. Potanin».

Примечание. На гербарном листе типа имеется рисунок деталей строения корзинки, выполненный К. Винклером.

36. *Crepis disciformis* Mattf., 1935, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 12, 115: 685. (= *Syncalathium disciforme* (Mattf.) Ling, 1965, Acta Phytotax. Sin. 10: 286).

Isotypus: «China, southwestern Kansu, T'ao River basin: gravelly slopes of Mt. Kwang Kei, W. Tebbu land, alt. 13000ft. X 1925, [fl. et fr. immat.], N 13729, J. F. Rock» (LE).

Typus: B

По протологу: «China: Kansu austro-occidentalis, vallis fluminis T'ao, regio Tebbu occid., in declivibus glareosis montis Kwang Kei, 4000 m s. m. (J. F. Rock N 13729, October 1925, fruct. et flor.)».

37. *C. henryi* Diels, 1901, Bot. Jahrb. 29: 633. (= *Youngia henryi* (Diels) Babcock et Stebbins, 1937, Carnegie Inst. Washington Publ. 484: 83).

Syntypus: «China: Prov. Hupeh. Recd. III 1889, [fl.], N 6069, A. Henry» (LE).

По протологу: «Ost-District (Henry 6069 — fl.)».

38. *Echinops grijsii* Hance, 1866, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 5, 5: 221.

Syntypus: China, «in montosis prov. Fokien. 1863, [fl.], N 1445, C. de Grijs, Herb. H. F. Hance» (LE).

По протологу: «Legi m. Novembri 1857, in monte Lam-tai-wu, ex adverso urbis Amoy, alt. circ. 2000 ped. supra oceani aequor, comitante amic. De Grijs, qui nuper etiam specimina misit a se ipso in montosis prov. Fokien lecta (Herb. propr., n. 1445)».

39. *Eclipta dentata* Lévl. et Vaniot, 1910, Bull. Acad. Intern. Géogr. Bot. (Le Mans) 20: 11. (= *Wedelia prostrata* (Hook. et Arn.) Hemsl. fide X. L. Huang, 1979, in Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 353).

Syntypus: «Corea, Quelpaert, in arenosis littoris E. 10 IX 1908, [fl.], N 1038, T. Taquet » (LE).

По протологу: «Corée: Quelpaert, sables du rivage a l'est, 10 sept. 1908 (Taquet, 1038)».

40. *E. thermalis* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 39. (= *E. prostrata* (L.) L. fide X. L. Huang, 1979, in Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 344).

Syntypus: China, «на дороге к р. Хуньхэ от фр. кладбища, растет на берегу стоячих луж. Собрана последних чисел августа 1831 г.» fl., Bunge, (LE).

Syntypi (2): «China bor. [1831, fl.], Bunge» (LE).

По протологу: «ad thermas prope Tan-schan».

41. *Eupatorium fortunei* Turcz., 1851, Bull. Soc. Nat. Moscou 24, 1: 170.

Syntypus: «China. [fl.], Fortune A. 20 (Herb. F. B. Forbes, N 2611)» (LE).

По протологу: «China borealis. Fortune coll. n. 20. A».

42. *E. kirilowii* Turcz., 1837, Bull. Soc. Nat. Moscou 10, 7: 153.
(= *E. lindleyanum* DC. fide C. Shih, 1985, in Fl. Reip. Pop. Sin. 74: 59).

?Syntypus: «China, от Жэхэ на север, Хэ-цзя-гоу. [fl.], herb. Fischer» (LE).

По протологу: [China boreali, Kirilow].

43. *E. stoehadosmum* Hance, 1862, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 4, 18: 222. (= *E. fortunei* Turcz. fide C. Shih, 1985, in Fl. Reip. Pop. Sin. 74: 58).

? Syntypus: China, «In prov. Cantonensi. a. 1881, [fl., fr.], N 9817, herb. H. F. Hance» (LE).

По протологу: «Sinis in ollis cultum. Specimina obtinui culta florentia m. Novembri 1862 (Herb. propr., n. 9817)».

Примечание. Вероятно, на этикетке допущена ошибка в указании даты сбора.

44. *Gerbera delavayi* Franch., 1888, Journ. Bot. (Paris) 2: 68.

Syntypus: «Chine, prov. Yun-nan, in pinetis ad Choui-tsin-yn, prope Tapintze, alt. 1800 m. 3 II 1886, [fl.], N 1918, Delavay» (LE).

По протологу: «In silvis ad Choui-tsin-yn, alt. 1800 m (Delavay, n. 1918)».

45. *G. raphanifolia* Franch., 1888, Journ. Bot. (Paris) 2: 67.

Syntypus: «Chine, prov. Yun-nan, in silvis ad Mo-che-tchin supra Ta-pin-tze. 15 I 1886, [fl.], N 1922, Delavay» (LE).

По протологу: «In silvis ad Mo-che-tsin (Delavay, n. 597, 1922)».

46. *G. uncinata* Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, sér. 2, 2: 41.
(= *G. delavayi* Franch. fide Y. C. Tseng, 1996, in Fl. Reip. Pop. Sin. 79: 89).

Syntypi (3): «China, provincia Yunnan, montagnes arides. Mars, N 255, [fl.], Herb. G. Bonati» (LE).

По протологу: «Yunnan: hautes montagnes arides (sans nom de localité), mars 1905 (leg. R. P. Maire, N 255 in herb. Bonati)».

Примечание. Только на одном из трех гербарных листов этикетка коллекции G. Bonati, на двух других — этикетки E. Maire; на одном из них приклеена еще рукописная этикетка с номером 255, месяцем сбора, соответствующим протологу, и указанием экологических условий (montagnes arides). Но вполне очевидно, что растения на всех листах представляют один сбор.

47. *Gynura aurita* C. Winkl., 1895, Тр. Перепб. бот. сада 14: 151. (= *G. japonica* (Thunb.) Juel. fide Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 312).

LECTOTYPUS (Illarionova, hoc loco): «China, Sze-chu'an inter Siao-Shinta et Wa-sze-k'ou. 14 VII 1893, [fl.], Kachkarow» (LE, cum isolectotypo).

Syntypus: «Tibet, Kam. In valle fl. Tung-go-ho. 22 VII 1893, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in China provincia Sze-ch'uan inter Siao-Shinta et Wa-sze-k'ou (14/VII 1893, Kaschkarow) nec non in Tibetiae orientalis valle fluvii T'ung-ho inter Tatsienlu et Lifanfu (22/VII 1893, Potanin)».

Примечание. Вместе с типами в гербарной обложке имеется рисунок вегетативных и генеративных частей растения, выполненный К. Винклером.

48. *Heteropappus sampsonia* Hance, 1867, Journ. Bot. (London) 5: 370. (= *Aster sampsonii* (Hance) Hemsl. ex F. B. Forbes et Hemsl., 1888, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 23: 415).

Syntypus: «China, in subus Pashuan supra Cantonem. X 1869₂ [fl.], N 13776, T. Sampson, herb. H. F. Hance » (LE).

По протологу: «In herbidis secus fluvium West River, provinciae Cantonensis, Januario 1867, coll. cl. Sampson (Exsicc. n. 13776), Herb. H. F. Hance».

Примечание. Возможно, на этикетке допущена ошибка в указании даты сбора.

49. *Inula ammophila* Bunge, 1836, Prodr. 5: 470. (= *I. salsoloides* (Turcz.) Ostenf. fide Y. Ling, 1979, Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 278).

Syntypi: «Chin. bor. [fl.], Bunge»; «Chin. bor. [fl.], Bunge, herb. Fischer» — (LE).

По протологу: «in sabulosis Chinae borealis legit cl. Bunge».

Примечание. Растения смонтированы на одном гербарном листе.

50. *I. linariaefolia* Turcz., 1837, Bull. Soc. Nat. Moscou 10, 7: 154.

Syntypus: «Pekin. [fl.], Kirilow, herb. Fischer» (LE).

По протологу: [China boreali, Kirilow].

51. *I. repanda* Turcz., 1837, Bull. Soc. Nat. Moscou 10, 7: 154. (= *I. japonica* Thunb. fide Y. Ling, 1979, Fl. Reip. Pop. Sin. 75: 263).

?Syntypus: «China. [fl.], herb. Fischer» (LE).

По протологу: [China boreali, Kirilow].

52. *Jurinea salwinensis* Hand.-Mazz., 1925, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien) 62, 9: 69. (= *Mazzettia salwinensis* (Hand.-Mazz.) Iljin, 1955, Бот. мат. (Ленинград) 17: 443).

Syntypus: China, «Prov. Yünnan bor.-occid.: prope fines Tibeto-Burmanicas inter fluvios Lu-djiang (Salween) et Djiou-djiang (Irrawadi or. sup.), in prato alpino retro montem Gomba-la supra Tschamutong ad lacum Tsukue, substr. micoschistaceo, alt. s. m. ca. 3825 m. 15–17 VIII 1916, [fl.], N 9910, Handel-Mazetti, Iter Sinense 1914–1918» (LE).

По протологу: «Prov. Yünnan bor.-occ.: In pratis alpinis et frigide temperatis inter fluvios Mekong, Salwin et Irrawadi, 27°52'–28°, in latere orient. jugi Tschiangschel legi 3 VII 1916 (N 9220), ad lacum Tsukue leg. collectores mei 15–17 VIII 1916 (N 9910), ad pascue Dotitong fossas turfosas, legi 28 VIII 1916 (N 9987), s. micoschistaceo, 3275–3900 m».

Примечание. Процитированный образец является голотипом рода *Mazzettia* Iljin, l. c.: 443.

53. *Lactuca amoena* Hand.-Mazz., 1924, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien) 61: 23. (= *Dubyaea amoena* (Hand.-Mazz.) Stebbins fide C. Shih, 1997, in Fl. Reip. Pop. Sin. 80, 1: 90).

Isotypus: China, «Prov. Yünnan bor.-occ.: prope fines Tibeto-Birmanicas inter fluvios Lu-djiang (Salween) et Djiou-djiang (Irrawadi or. sup.), in prato alpino retro montem Gomba-la supra Tschamutong, ad lacum Tsukue. Substr. micoschistaceo; alt. s. m. ca. 3825 m. Leg. 15–17 VIII 1916, [fl.], coll. indig. (Diar. N 1855)» (LE).

По протологу: «Prov. Yünnan bor.-occ.: In prato alpino ad lacum Tsukue inter fluvios Salween et Irrawadi supra Tschamutong, S. micoschistaceo, 3825 m, leg. 15–17 VIII 1916 collectores mei (Nr. 9913)».

54. *L. formosana* Maxim., 1874, Mém. Biol. Acad. Sci. Pétersb. 9: 353. (= *Pterocypsela formosana* (Maxim.) Shih, 1988, Acta Phytotax. Sin. 26: 389).

Holotypus: «Formosa, Tamsuy. 1864, [fr.], N 279, R. Oldham» (LE).

По протологу: «hab. in Formosa, prope Tamsuy (Oldham, n 279)».

55. *L. oldhamii* Maxim., 1874, Mém. Biol. Acad. Sci. Pétersb. 9: 363. (= *Ixeridium laevigatum* (Bl.) Shih, 1993, Acta Phytotax. Sin. 31: 545).

Syntypi: «Formosa, Tamsuy. 1864, [fl.], N 290, R. Oldham»; «Philippinae ins., ins. Panay. [fl. et fr.], N 1642, Cuming» — (LE).

По протологу: «hab. in ins. Formosa, prope Tamsuy (Oldham, n 290) et ejusdem, ni fallor, speciei cauliculum fructiferum absque foliis radicalibus vidi ex ins. Panay Philippinarum (Cuming, n 1642)».

56. *L. umbrosa* Dunn., 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 513. (= *Mulgedium umbrosum* (Dunn.) Shih, 1988, Acta Phytotax. Sin. 26: 391).

Syntypi: «China, Yunnan, Szemao forests, 5000'. [fl.], N 11694, A. Henry»; «ibid., dry places. [fr.], N 11694 A, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Yunnan: in shade on dry clay walls of ravines in forests near Szemao, A. Henry, 11694, 11694 A».

57. *Leontopodium delavayanum* Hand.-Mazz., 1928, Beih. Bot. Centralbl. 44: 85.

Syntypus: China, «Yunan, Tsang-chan au dessus de Tali, alt. 4000 m. [fl.], N 205, Delavay, Recu le 30 X 1884» (LE).

По протологу: «Yunnan: Pentes de rochers au sommet du Tsang-chan au-dessus de Ta-li a 4000 m d'alt. (Delavay, 205). N.E. Upper Burma: Dry stony meadows on the W. flank of the Chimi-li N'Maikha-Salwin divide, 26°23' N., 98°48' E., 11–12000' (Forrest, 25025)».

58. *L. hallaisanense* Hand.-Mazz., 1928, Beih. Bot. Centralbl. 44: 72.

Syntypus: «Corea, in rupibus Hallaisan, 1500 m. VIII 1907, [fl.], N 1967, U. Faurie» (LE).

По протологу: «Crescit in rupibus montis Hallaisan insulae Quelpaert, 1500 m (Faurie 1964, 1967)».

59. *Ligularia jaluensis* Kom., 1901, Тр. Петерб. бот. сада 18: 420.

Lectotypus (Illarionova, hoc loco): «Mandschuria, prov. Kirinensis districtum, in valle fluvii Jalu supra Sesanpo. 19 VII 1896, [fl.], V. L. Komarov» (LE).

Syntypus: «Манджурия, область Мукден, долина р. Хун-цзяна, близ Падеджана, болотистый луг. 11 XI 1897, [пл.], В. Комаров» (LE).

По протологу: «Crescit in pratis silvaticis ad fluvii Jalu-dsian decursum supremum superiorem ac medium. Legi: 1). Inter Se-san-po et Karami ad ripam dextram, 19 VII 1897. 2). In valle fluvii Tun-dsian, fl. Jalu-dsian influentis prope Pa-de-dschan, 11 IX 1897. Manshuriae provincia Mukden, ad fines Koreae.»

Примечание. Растение, выбранное в качестве лектотипа, расположено на трех гербарных листах.

60. *L. potaninii* Pojark., 1950, Бот. мат. (Ленинград) 12: 314, non Ling, 1937. (= *L. tangutorum* Pojark., 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 362, pro nom. nov.).

Holotypus: «China occidentalis, regio Tangut (prov. Kansu), regio alpina 10500–11500' s. m., prope alpium Dschachar-dsargyn, in sylvis Juniperi frequens. 9/21 VI 1880, [fl.], N. M. Przewalski, № 335» (LE).

По протологу: «China occidentalis, regio Tangut (prov. Kansu), regio alpina 10500–11500 p. s. m., prope alpium Dschachar-dsargyn, in sylvis Juniperi frequens. 21 VI 1880, legit M. Przewalski, № 355».

Примечание. В протологе допущена неточность в указании номера сбора, поскольку цифры на этикетке написаны не достаточно четко.

Процитированный экземпляр также является типом *L. tangutorum* Pojark. Вследствие того, что уже существовал более ранний омоним *L. potaninii* Ling, в 1961 г. А. И. Поярковой было предложено новое название для описанного ею вида.

61. *Mulgedium meridionale* Shih, 1988, Acta Phytotax. Sin. 26, 5: 392.

Paratypus: «China, Yunnan: Mengzi, alt. 1800 m, 19 V 1955, fl., «N 123», Sina-Russ. Exped.» (LE).

По протологу: «Sichuan: Emei Shan, 20 VI 1955, Sina-Russ. Exped. 1763. Guangxi: C. F. Liang 32150; eodem loco, in sylvis in declivitate, 2 V 1957; idem 32058; Yongfu, in declivibus, 20 VI 1955, G. Q. Zhu 197. Yunnan: Luchun, in sylvis frondosis, alt. 1200 m, 7 V 1974, Luchun Exped. 447; loco dicto, alt. 900 m, 8 VI 1974, idem 1696; Pingbian, in angust., alt. 1400 m, 1 VI 1934, H. T. Tsai 60039 (Typus, PE); eodem loco, ad vias, 32 V 1934, idem 62065; Weixi, in sylvis mixtis, alt. 2300 m, VI 1935, C. W. Wang 64181; Lanping, 21 VI 1981, Hongduan Shan Exped. 717; Mengzi, alt. 1800 m, 19 V 1955, Sina-Russ. Exped. 123; Gong Shan, prope marginem sylvae, alt. 1700 m, T. T. Yu 19174».

62. *Myripnois dioica* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 38.

Syntypi: «Ch. b. [fl.], Bunge, herb. Ledebour»; «Ch. bor. [fr.], Bunge, herb. Fischer» — (LE).

По протологу: «habit. frequens in rupestribus boream spectantibus montium Zui-wey-schan».

63. *M. maximowiczii* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 12. (= *Pertya sinensis* Oliv. fide Y. C. Tseng, 1996, in Fl. Reip. Pop. Sin. 79: 5).

Л е с т о т и п у с (Grubov, in sched., Illarionova, hoc loco): «China borealis: Szetschuan septentrionali, долина р. Пэйхо выше дер. Хуннэй-ку. 24 VII 1885, [fl.], G. N. Potanin» (LE, cum isolectotypo).

По протологу: «hab. in China borealis provincia Szetschuan, in valle fluvii Peiho supra pagum Huneiku Julio mense anni 1885 cl. Potanin speciei novae tantummodo ramos foemineos decerpit».

64. *Nannoglottis carpesioides* Maxim., 1881, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 27: 481.

Syntypus: «China occidentalis, terra Tangutorum (prov. Kansu), jugum S. a fl. Tetung, in sylvis frondosis frequens. 27 VI/9 VII 1872, [fl.], N. M. Przewalski» (LE).

По протологу: «China occidentalis: in sylvis frondosis alpinis prov. Kansu (Przewalski, 1872)».

Примечание. На гербарном листе типа имеется рисунок деталей строения цветка, выполненный К. И. Максимовичем.

65. *Nouelia insignis* Franch., 1888, Journ. Bot. (Paris) 2: 67.

Syntypus: «Chine, prov. Yun-nan, in silvis et apertis, circa Tapin tze. 14 III 1887, [fl.], N 2498, Delavay» (LE).

По протологу: «In silvis et collibus apertis circa Tapin-tze; fl. 14 mart. 1887 (Delavay, N 2498, 619 et 245).

66. *Paraprenanthes sylvicola* Shih, 1988, Acta Phytotax. Sin. 26, 6: 419.

Paratypus: China, «Yunnan, [Maguan, in sylva, alt. 1300 m], 1956, [fl., fr.], N 3812, Sino-URSS Exped.» (LE).

По протологу: «Shaanxi: Taibaishan, T. N. Liou et P. C. Tsoong 2203. Sichuan: Wanyuan, in sylva, alt. 1200 m, P. Y. Li 4370; Emei, T. N. Liou 10510; Nanchuan, alt. 1750 m, 14 VIII 1957, J. H. Xong et Z. L. Zhou 92685 (Typus, PE). Jiangxi: Lianhua, in angustis, S. S. Liai 1580. Hunan: Sangzhi, in angustis, X. G. Li 204303; Sufengshan, Z. T. Li 3088, 2815; Xinning, alt. 850 m, Y. B. Luo 2655. Fujian: Yongan, in sylva, Y. Ling 3189, 5342. Yunnan: Maguan, in sylva, alt. 1300 m, Sino-URSS Exped. 3812. Guangxi: Guangxi Exped. 1248. Zhejiang: Xuexi, S. Y. Zhang 972».

67. *Picris junnanica* V. Vassil., 1955, Бот. мат. (Ленинград) 17: 459.

Н о л о т и п у с : «China, Yunnan, open pine forest on the eastern flank of the Lichiang Range, lat. 27°30', alt. 11000 ft. VI 1906, [fl.], N 2421, G. Forrest» (LE).

По протологу: «China australis, regio Yunnan, in pinetis in declivitate orientali jugi Lichiang, 3140 m s. m., VII 1906, N 2421, Georg Forest».

Примечание. В протологе допущена ошибка в указании месяца сбора.

68. *Prenanthes henryi* Dunn., 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 514. (= *Notoseris henryi* (Dunn.) Shih, 1987, Acta Phytotax. Sin. 25: 202).

Syntypus: «China, Yunnan, Feng Chen Lin, mt. forests, 7000'. [fl.], N 11214, A. Henry» (LE).

По протологу: «Szechuen: North Wushan, A. Henry, 7022, 7022 A; Yunnan: Feng Chen Lin, mountain forests, 7000 ft., A. Henry, 11214».

69. *P. sonchifolia* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 40. (= *Youngia sonchifolia* Maxim., 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 180; = *Ixeridium sonchifolium* (Maxim.) Shih, 1993, Acta Phytotax. Sin. 31: 543).

Syntypus: «Ch. b. [fl.], Bunge, herb. Ledebour» (LE).

По протологу: «hab. frequens in muris, ruderatis et montosis prope Pekinum».

70. *P. tatarinowii* Maxim., 1859, Mém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 474.

Л е с т о т и п у с (Grubov, in sched., Illarionova, hoc loco): «China, Fl. Pekin., в северных горах близ кумирни Чхан-кан. VIII 1856, [fl.], Dr. Tatarinow» (LE, cum isolectotypis 2).

По протологу: «hab. in declivibus montium a Pekino septentrionem versus, prope templum Tschshan-chanj, floret Augusto (Dr. Tatarinow legit)».

71. *Pyrethrum lavandulaefolium* Fisch. ex Trautv., 1872, Тр. Перерб. бот. сада 1: 181. (= *Dendranthema lavandulaefolium* (Fisch. ex Trautv.) Ling et Shih, 1980, Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 6: 5).

Л е с т о т и п у с (Grubov, in sched., Illarionova, hoc loco): China, «Pekin, 1843, [fl.], ex herb. Fischer» (LE, cum isolectotypo).

По протологу: «Prope Kalgan».

72. *Saussurea aristata* Lipsch., 1961, Бот. мат. (Ленинград) 21: 363.

Н о л о т и п у с : «КНР, Гириньская пров., уезд Аньпу, Эрдаогоу, в лесу, 390 м над у. м. 30 VIII 1951, [цв.], N 3770, Liou Tchen-ngo, Chou Yi-liang» (LE).

По протологу: «Китай, Гириньская провинция, уезд Аньпу, Эрдаогоу, в лесах, 390 м над у. м. 30 VIII 1951, № 3770, Liou Tchen-ngo, Chou Yi-liang».

73. *S. brunneopilosa* Hand.-Mazz., 1937, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13: 651.

Syntypi (2): Central Kansu, Lien hoa shan: alpine regions among rocks, alt. 11500 ft. 14–20 VII 1925, [fl.], N 12721, J. F. Rock» (LE).

По протологу: «Kansu: Tangut, 1872 (Przewalski: Hb. Kew.). Lienhoa-shan, alpine Region zwischen Felsen, 3500 m, 20 VII 1925 (Rock 12721, Typus: Hb. Berlin, Mus. Wien)».

74. *S. chenopodifolia* Klatt ex Schlagintw., 1878, Sitzungsber. Akad. Wiss. München 8: 92.

Syntypus: «Tibet, prov. Hasóra, environs of Táshing (north-west of Astor or Hasóra). 16-24 IX 1856, [fl.], Cat. N 6847, herb. Schlagintweit» (LE).

По протологу: Tibet, Provinz Hasóra: Von Das viâ Góltère oder (Naugáu) nach Hasóra (oder A'stor), Thalweg 10900'–7100', coll. 8 bis 20 Sept. 1856, Cat. N 6410. Táshing und Umgebungen, Abhänge am rechten Ufer des Hasóra-Thales, 9500'–10 200', coll. 16 bis 24 Sept. 1856, Cat. N 6847 und N 7411».

75. *S. conyzoides* Hemsl., 1892, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 29: 309.

Isotypus: «China, Hupeh. Recd. III 1889, [fl.], N 7575, A. Henry» (LE).

Typus: K.

По протологу: «Hupeh: Fang, A. Henry, 7575».

76. *S. cordifolia* Hemsl., 1892, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 29: 310.

Isolotypus: «China, prov. Hupeh. [fl.], N 6640, [Fang], Herb. A. Henry, Recd. III 1889» (LE)

Syntypi: «China, Ichang (Patung district). [fr. immat.], N 414, A. Henry, Recd. III 1886»; «ibid. V 1888, [fl.], N 5075, A. Henry»; «China, Szechwan (S. Wushan). [fl.], N 7460, A. Henry, Recd. III 1889» — (LE).

Lectotypus (Lipsch., 1979): K.

По протологу: «Hupeh: Patung district, Dr. A. Henry, 414, 5075, and Fang, 6640. Szechuen: South Wushan, Dr. A. Henry, 7460».

77. *S. decurrens* Hemsl., 1892, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 29: 310. (= *S. hemsleyi* Lipsch., 1966, Бот. журн. 51, 10: 1497).

Syntypus: «China, prov. Hupeh. Recd. III 1889, [fl.], N 6775, A. Henry» (LE).

По протологу: «Hupeh: Fang, Dr. A. Henry, 6775».

78. *S. giraldii* Diels, 1905, Bot. Jahrb. 36, 82: 108. (= *S. likiangensis* Franch. fide C. Shih et S. Y. Jin, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 78, 2: 145).

Syntypus: «Cima del Monte Thae-pei-san, Shen-si settentr. (Cina). 10–20 VIII 1894, [fl.], N 328, G. Giraldi» (LE).

По протологу: «Gipfel des T'ai pa shan. Blüh. Ende August (Giraldi 328 und 3170)».

79. *S. henryi* Hemsl., 1892, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 29: 311.

Syntypi: «China, prov. Hupeh. Recd. III 1889, [fl.], N 7068 A, A. Henry»; «China, prov. Szechuan. Recd. III 1889, [fl.], N 7068, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Hupeh: North Patung, Dr. A. Henry, 7068 A; Szechuen: South Wushan, Dr. A. Henry, 7068».

Примечание. Растения смонтированы на одном гербарном листе.

80. *S. iodostegia* Hance, 1878, Journ. Bot. (London) 16 (n. s. vol. 7): 109.

? Syntypus: «China, in m. Siao-Wu-tai-shan (ultra 10 000'), 250 stad. a Pekin ad W. 1876, [fl.], Hancock» (LE).

По протологу: «In m. Siao Wu-tai-shan, Chinae septentrionalis, m. Julio 1876, legit W. Hancock (Herb. propr. n. 20148)».

81. *S. komarnitzkii* Lipsch., 1954, Бюлл. Моск. общ. исп. прир., отд. биол. 59, 6: 81.

Н о л о т у п у s : «China, Kweichow, Hsing Shan, alt. 2100 m. 5 X 1931, [fl.], N 647, A. N. Steward, C. Y. Chiao, H. C. Cheo» (LE).

По протологу: «China, Hsing-Shan, alt. 2100 m. 5 X 1931, N 647. Coll. A. N. Steward, C. Y. Chiao, H. C. Cheo».

82. *S. ladyginii* Lipsch., 1954, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 59, 6: 77.

Н о л о т у п у s : «Кам (Тибет), бассейн Ян-цзы-цзяна (р. Голубой), уроч. Дарин-до, близ монастыря Чжерку, 11400 фут. а. в. 8 VIII 1900, [fl.], N 453, В.Ф. Ладыгин» (LE, cum isotypo).

По протологу: «Kam (Tibet), systema fl. Jan-dzi-dsian («Golubaja»), Darindo, 3510 m s. m. 8 et 9 VIII 1900, N 453, V. Ladygin».

83. *S. lamprocarpa* Hemsl. ex F. B. Forbes et Hemsl., 1888, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 23: 465. (= *S. deltoidea* (DC.) Sch.-Bip. fide C. Shih et S. Y. Jin, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 78, 2: 63).

Syntypus: «China, Ichang, Patung district. V 1888, [fl.], N 4972, A. Henry» (LE).

По протологу: «Hupeh: Patung district, Nanto and mountains to the northward (A. Henry, 2470, 2675, 4972)».

84. *S. larionowii* C. Winkl., 1891, Тр. Петерб. бот. сада 11: 376.

Л е к т о т у п у s (Lipsch., in sched., Illarionova, hoc loco): China, «Juldus major ad rivulum Charssala. 8 VII 1876, [fl.], Larionow» (LE, cum isolectotypo).

По протологу: «Hab. in monte Juldus majore ad ripas rivuli Charssala. Julio mense anni 1876 cl. Larionow collegit».

Примечание. Образец, выбранный нами в качестве лектотипа, помечен С. Ю. Липшицем как «*typus*», также на этом гербарном листе имеется рисунок деталей строения цветка, выполненный К. Винклером.

85. *S. paleata* Maxim., 1859, Мém. Sav. Étr. Pétersb. 9: 168.

Syntypus: «China. [fl.], Hb. Fischer» (LE).

По протологу: «in China boreali (Rel. Fisch.)».

86. *S. pectinata* Bunge ex DC., 1837, Prodr. 6: 538.

Syntypus: «Ch. bor. [fl.], Bunge, Herb. Meyer» (LE).

По протологу: «In China boreali detexit cl. Bunge».

87. *S. petrovii* Lipsch., 1972, Бот. журн. 57, 4: 524.

Т у р u s : «Китай, Ганьсу, к югу от г. Ланьчжоу, гора Учаншань, 1700 м, на сухих склонах. 25 VI 1957, [цв.], М. П. Петров» (LE, cum isotypo).

По протологу: «China. In declivitatibus siccis montis Utschanschan prope urbem Landshou, 1700 m, 25 VI 1957, M. Petrov».

88. *S. pinnatidentata* Lipsch., 1972, Бот. журн. 57, 4: 524.

Т у р u s : «Китай, пров. Цинхай, пустыня Цайдам, в 40 км к востоку от г. Синин, по обочине дороги у камней. 3 VIII 1959, [цв.], М. П. Петров» (LE, cum isotypo).

Р а г а т у р u s : «Китай, Внутренняя Монголия, пустыня Алашань, Баян-Хото, пески Тенгери, Чахаяньчи. 9 VIII 1958, [цв.], М. П. Петров» (LE).

По протологу: «China, prov. Zinchai, desertum Zaidam, in viciniis urbis Sinin, 3 VIII 1959, M. Petrov; paratypus: «China, desertum Alaschan, Bain-Choto, in arenis Tengeri, 9 VIII 1958, M. Petrov».

89. *S. polypodioides* Anthony, 1934, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 28: 209.

И s o t y p u s : «SW. China. [fl.], N 2966, G. Forrest (ex herb. hort. Reg. Bot. Edin.)» (LE).

Т у р u s : E.

По протологу: «China, Yunnan. Open mountain meadows on the eastern flank of the Lichiang Range. Lat. 27°20' N. Alt. 12–13.000 ft. In flower, Sept. 1906. G. Forrest, 2966».

90. *S. poochlamis* Hand.-Mazz., 1925, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien) 62, 2: 15.

Syntypus: «China, prov. Yunnan bor.-occid.: prope urbem Lidjiang («Likiang»), imprimis in monte Yülung-schan. 1914–1918, [fl.], N 3678, Handel-Mazetti» (LE).

По протологу: «prov. Yunnan: in pratis alpinis montis Yülung-schain prope Lidjiang («Likiang»), leg. X 1914, C. Schneider, n 2580, collectores mei (n 3678), s. calceo, 3200–3800 m.».

91. *S. reniformis* Ling, 1949, Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 6, 2: 77. (= *S. acromelaena* Hand.-Mazz. fide C. Shih et S. Y. Jin, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 78, 2: 179).

И s o t y p u s : China, «Honan, Lushi shien, 1450 m, bois de haute montagne. 13 VIII 1935, [fl.], N 5102, K. M. Liou» (LE).

Турпус: PE

По протологу: «Honan: Lushih-hsien, Laochüingshan, bois des hautes montagnes, alt. 1400 m., 15 VIII 1935 (K. M. Liou 5102)».

Примечание. В протологе допущена неточность в указании даты сбора.

92. *S. salicifolia* DC. var. *chinensis* Maxim., 1879, Bull. Soc. Nat. Moscou 54, 1: 28. (= *S. chinensis* (Maxim.) Lipsch., 1966, Бот. журн. 51, 10: 1496).

Нолотурпус: «China, in m. Siao-Wu tai shan (ultra 10 000'), 250 stad. a Pekin ad W. 1876, [fl.], Hancock» (LE).

По протологу: «In monte Siao-wu-tai-shan (Hancock)».

93. *S. sinuata* Kom., 1907, Тр. Петерб. бот. сада 25: 735, tab. 14.

Сынтурі (2): «Манджурия, девств. лес Манджурского хребта, долина Ичэсун хэ на пути из Омосо в Гирин. 5 VIII 1896, [fl.], Комаров» (LE).

Сынтурпус: «Манджурия, девств. лес у перевала Лоэлин (на пути из Омосо в Гирин). 31 VIII 1896, [fl.], Комаров» (LE).

По протологу: «собр. мною: в 1895 г. 1) 3–5 Авг. дол. Ичесунхе; 2) 30 Авг. у Лоелина».

94. *S. tibetica* C. Winkl., 1894, Тр. Петерб. бот. сада 13: 242.

Нолотурпус: «Tibet borealis, ad fl. Hoangho sup. VII 1884, [fl.], Przewalski» (LE).

По протологу: «in Tibetia boreali; ad fluvium Hoang-ho superiorem Julio mense anni 1884 cl. Przewalsky collegit».

95. *S. umbrosa* Kom., 1901, Тр. Петерб. бот. сада 18: 423.

Сынтурпус: «Манджурия, лес у дороги из Нингуты в Омосо между станциями Элль-джан и Тала-джан. 24 VII 1896, [цв.], В. Комаров» (LE).

Сынтурпус: LE, п-ов Корея (см.: Илларионова, 2004).

По протологу: «In silvis umbrosis humidis montium Manshuriae, nec non Koreae septentr. Legi: 1). In silvis jugi Manshurici secus viam ab oppido Ninguta ad oppidulum Omoso prope trajectum San-tha-alin, 24 VII 1896. 2). In silvis jugi Koreani ad trajectum Abuzsa. Koreae septentr. provincia Keng-son, distr. Musang. 19 VI 1897».

96. *S. ussuriensis* Maxim. var. *mongolica* Franch., 1884, Pl. David. 1: 170. (= *S. mongolica* (Franch.) Franch., 1897, Bull. Herb. Boiss. 5, 7: 539).

Сынтурпус: «Chine (Mongolie orientale), Gehol, montagnes. Fin d'août 1864, [fl.], N 2141, A. David» (LE).

По протологу: «Mongolie: Géhol, sur les montagnes (n. 2141, 2110). Fin d'août 1864».

97. *S. veitchiana* Drumm. et Hutch., 1911, Kew Bull.: 190; Curtis's Bot. Mag. 137, tab. 8381.

И с о т у п у с : «C. China, W. Hupeh. 7 VII, [fl.], N 2407, E. H. Wilson» (LE).

Т у п у с : К.

По протологу: «Central China, Fang, E. H. Wilson, 2407».

98. *Scorzonera albicaulis* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 40.

С у н т у п и : «China. 1831, [fr.], Bunge»; «Ch. bor. [fl.], Bunge» — (LE).

По протологу: «hab. ad radices montium septentrionalium prope Lun-züan-ssy».

99. *S. sinensis* Lipsch. et Krasch., 1935, в Липшиц, Фрагм. моногр. рода *Scorzonera*: 120, in syn. *S. austriaca* Willd. ssp. *sinensis* Lipsch. et Krasch.

С у н т у п и : China, «Flora Pekinensis. 1877, [fr.], N 461, Dr. Brettschneider»; ibid. 1877, [fr.], N 462, Dr. Brettschneider» — (LE).

По протологу: «Prope urb. Pekin, D-r Brettschneider, 1877».

100. *Senecio acerifolius* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 9. (= *Sinosenecio winklerianus* (Hand.-Mazz.) B. Nord. fide B. Nord., 1978, Opera Bot. (Lund) 44: 51).

С у н т у п и : «China borealis: Szetschuan septentrionali. Долина р. Ксернцо. 25 VII/6 VIII 1885, [fl.], Potanin»; «ibid., Kansu orientali. Долина Чагонская. 28 VI/10 VII 1885, [fl.], Potanin»; «ibid., Гора Чагола. 29 VI/11 VII 1885, [fl.], Potanin» — (LE).

По протологу: «in Chinae borealis provincia Szetschuan. Ad ripas fluvii Kserntso (?) Augusto mense anni 1885 nec non prope pagum Tshagon et in monte Tshagola provinciae Kansu Julio mense ejusdem anni legit cl. Potanin».

101. *S. begoniaefolius* Franch., 1894, Journ. Bot. (Paris) 8: 358. (= *Parasenecio begoniaefolius* (Franch.) Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 28).

С у н т у п у с : «China: prov. Szechwan. [fl.], N 7116, A. Henry, Recd. III 1889» (LE).

По протологу: «Su-tchuen oriental, montagne de Tchen-kéou-tin (R. P. Farges); Su-tchuen (Dr. Henry, n. 7116, Kew distrib.)».

102. *S. botryodes* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 154. (= *Ligularia botryodes* (C. Winkl.) Hand.-Mazz., 1938, Bot. Jahrb. 69: 126).

Holotypus: «Tibet, Kam. Камское нагорье, дол. р. Шу-ба-гу. 8 VIII 1893, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in Tibetiae orientalis valle fluminis Shu-pa-ku inter Tatsienlu et Lifanfu (8/VIII 1893, Potanin)».

103. *S. caroli* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 7. (= *Sinacalia caroli* (C. Winkl.) C. Jeffrey et Y. L. Chen, 1984, Kew Bull. 39, 2: 218).

Holotypus: «China borealis: Szetschuan septentrionali. Valle fl. Honton supra pontem Dshandshi-kou, in rupibus. 13 VIII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in Chinae borealis provincia Szetschuan. In valle fluvii Honton supra pontem Dsha-dshi-ku Augusto mense anni 1885 cl. Potanin collegit».

104. *S. dodrans* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 152.

Holotypus: «China borealis: Szetschuan septentrionali. Сюешань. 11 VIII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in China provincia Sze-ch'uan prope Sin-e-tang. Augusto mense 1885 cl. Potanin decerpit».

105. *S. duciformis* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 155. (= *Ligularia duciformis* (C. Winkl.) Hand.-Mazz., 1936, Symb. Sin. 7, 4: 1135).

Lectotypus (Illarionova, hoc loco): «China occidentalis, prov. Szechuan, Ta-tsien-lu. 3 VI 1893, [fl.], Potanin» (LE).

Syntypus: «Tibet, Kam, Hung-kiao. 9 VIII 1893, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in China provincia Sze-ch'uan prope urbem Tatsienlu (3/VI 1893, Potanin) nec non in Tibetia orientali ad pontem Hung-k'iao (9/VIII 1893, Potanin)».

Примечание. Процитированные синтипы представляют собой разнородный материал и, по нашему мнению, относятся к разным видам. Растения отличаются количеством цветков в корзинке, опушением листочков обертки, их количеством, соотношением длины обертки и венчика. Образец из пров. Сычуань, который мы выбираем лектотипом, более соответствует описанию в протологе и, к тому же, растения именно с такими признаками рассматриваются в литературе как *Ligularia duciformis* (C. Winkl.) Hand.-Mazz.

106. *S. euryphyllus* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 156. (= *Ligularia euryphylla* (C. Winkl.) Hand.-Mazz., 1938, Bot. Jahrb. 69: 108).

H o l o t y p u s : «China occidentalis, prov. Szechuan. Ta-tsien-lu supra pagum Tshungu (Chungu). 16 VIII 1893, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in China provincia Sze-ch'uan prope urbem Tatsienlu supra pagum Ch'ungu (16/VIII 1893, Potanin)».

107. *S. gynura* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 157.

H o l o t y p u s : «China borealis: Szetschuan septentrionali. Долина р. Нэрэку. 26 VII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in Chinae provincia Sze-ch'uan ad ripas fluminis Nereku. Julio mense anni 1885 cl. Potanin».

108. *S. hoi* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 506. (= *Cissampelopsis volubilis* (Bl.) Miq. fide Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 220).

Syntypi: «China, Yunnan, Mengtze, S. E. mts. 6000', in forests. [fl.], N 10392 A. Henry»; *ibid.*, [fl.], N 10392 A, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Yunnan: Mengtze forests at 5000-6000 ft., A. Henry, 10392, 10392 A».

109. *S. kaschkarowii* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 152. (= *S. faberi* Hemsl. fide Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 269).

H o l o t y p u s : «China, Sze-chuan, Tai-siang-kuan-ling. 22 VII 1893, [fl.], Kachkarow» (LE).

По протологу: «in Chinae provincia Sze-ch'uan in pylis T'ai-siang-luan-ling (22/VII 1893, Kaschkarow)».

110. *S. liatroides* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 8. (= *Ligularia liatroides* (C. Winkl.) Hand.-Mazz., 1938, Bot. Jahrb. 69: 121).

H o l o t y p u s : «China borealis: Szetschuan septentrionali. Долина р. Пэйхо. 24 VII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in Chinae borealis provincia Szetschuan. In valle fluminis Peiho Julio mense anni 1885 cl. Potanin exemplaria pauca decerpit».

Примечание. К гербарному листу типа прикреплен рисунок частей цветка и общего вида растения, сделанный автором.

111. *S. luticola* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 507. (= *S. asperifolius* Franch. fide Y. L. Chen, 1999, in Fl. Reip. Pop. Sin. 77, 1: 290).

Syntypus: «China, Yunnan, Mengtze, clay hills, 5000'. [fl.], N 9916, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: common on barren clay-hills near Mengtze, in exposed arid situations, A. Henry, 9916; Hancock, 9».

112. *S. oldhamianus* Maxim., 1871, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 16: 219. (= *Sinosenecio oldhamianus* (Maxim.) B. Nord., 1978, Opera Bot. (Lund) 44: 50).

Syntypi: «China, Ningpo. 1861, [fl.], N 58, Oldham»; «ibid., 1861, [fl.], N 62, Oldham» — (LE).

По протологу: «in China media, prope Ning-po (Oldham, 1861, N 62 et 58).

113. *S. potaninii* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 5. (= *Ligularia potaninii* (C. Winkl.) Ling, 1937, Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 5, 1: 4)

Нолютурус: «China borealis: Szetschuan septentrionali. Перевал м. рр. Хонтон-Лунва и Ату-Лунва. 10 VIII 1885, [fl.], Potanin» (LE).

По протологу: «in Chinae borealis provincia Szetshuan. Ad trajectum inter fluvios Honton-lunwa et Atu-lunwa Augusto mense anni 1885 in argillosis legit cl. Potanin».

114. *S. putjatae* C. Winkl., 1895, Тр. Петерб. бот. сада 14: 125. (= *Ligularia putjatae* (C. Winkl.) Hand.-Mazz., 1938, Bot. Jahrb. 69: 120).

Нолютурус: China, Chihli, «Вэйчанг. 1891, [fl.], Putjata» (LE).

По протологу: «Chihli, in sylvis Wei-chang».

115. *S. solenoides* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 502. (= *Nemosenecio solenoides* (Dunn) B. Nord. 1978, Opera Bot. (Lund) 44: 46).

Syntypus: «China, Yunnan, Mengtze, E. mts. 6000'. [fl.], N 9678, A. Henry» (LE).

По протологу: «Yunnan: mountains east of Mengtze at 6000 ft., A. Henry, 9678. A starved state with one head only, Mi-lê, A. Henry, 9678 A».

116. *S. stolonifer* Cuf., 1933, Feddes Repert. (Beih.) 70, 2: 100. (= *Tephrosieris stolonifera* (Cuf.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8: 174).

Syntypi: China, «Prov. Setschwan austro-occid.: prope oppidum Dötschang («Tetschang») in valle Djientschang («Kientschang») ad regionis subtropicae rivos, substr. arenaceo, alt. ca. 1450 m s. m. 6 IV 1914, [fl.], N 1193, Handel-Mazetti, Iter Sinense 1914–1918»; «Prov. Yünnan bor.-occid.: prope pagum Yungning, in regionis temperatae uliginosis, substr. arenaceo, alt. ca. 2725 m s. m. 22 VI 1914, [fl.], N 3145, Handel-Mazetti, Iter Sinense 1914–1918» — (LE).

По протологу: «China. Setschwan austro-occident.: pr. oppidum Dötschang («Tetschang») in valle Djientschang («Kientschang»), ad regionis subtropicae

rivos, substr. arenaceo, ca. 1450–1650 m s. m., 6 IV 1914 (v. Handel-Mazetti, Iter Sin. 1914–18, N 1193. Yün-nan bor.-occident.: pr. oppidum Yungning, in regionis temperatae uliginosis, substr. arenaceo, ca. 2725 m s. m., 22 VI 1914 (v. Handel-Mazetti, Iter Sin. 1914–18, N 3145».

117. *Serratula forrestii* Pjlin, 1928, Изв. Главн. бот. сада СССР, 27, 1: 91.

Syntypus: «West China, Yunnan, Mekong, Yangtze divide, lat. 27°40', alt. 10000 ft. Aug. 1914, [fl.], N 13146, G. Forrest» (LE).

По протологу: «China, Yunnan: 1). Lali, 25°40' lat., 1913, N 11541, leg. G. Forrest; 2). planities alta Chungtiensis, 27°35' lat., 1913, N 1097, leg. G. Forrest; 3). Mekong, 27°40' lat., 1914, N 13146, leg. G. Forrest; 4). montes Iungpeh, 26°42' lat., 1918, N 16888, leg. G. Forrest».

Примечание: растение расположено на двух листах.

118. *S. komarovii* Pjlin, 1928, Изв. Главн. бот. сада СССР, 27, 1: 89. (= *S. centauroides* L. fide C. Shih, 1987, in Fl. Reip. Pop. Sin. 78, 1: 172).

Syntypi: «Sungari. 26 VII 1859, [fl.], Maximowicz»; «Манчжурия, Гиринск. пров., д. Сязантой, на склонах между кустарниками. 13 VIII 1905, [fl.], Сюзев»; «Сев. Маньчжурия, Мергенский округ, на пути от Тупкэна к Айгуну через Эркэшань. 13 VI – 13 VII 1910, [fl.], В. Ладыгин»; «Мергенский округ, вулканы Эркэшань и др. 13 VI – 13 VII 1910, [fl.], В. Ладыгин» — (LE).

По протологу: «Regio amurensis et ussuriensis et Manshuria. Reg. Amur: ...; reg. Ussur: 7) lac. Chanka, 1867, leg. Przewalsky; 8) fl. Sujfun, 1913, N 404, leg. Schiptschinsky; Manshuria: 9) Sungary, 26 VII 1859, leg. Maximowicz; 10) distr. Girin, pag. Sjasantoj, 13 VIII 1905, leg. Sjusev; 11) distr. Mergen, inter Tunken et Ajgun, 1910, leg. Ladygin; 12) distr. Mergen, Erkeschan, 1910, leg. Ladygin».

119. *S. polycephala* Pjlin, 1928, Изв. Главн. бот. сада СССР, 27, 1: 90. (= *Klasea polycephala* (Pjlin) Kitag., 1947, Journ. Jap. Bot. 21: 140).

Syntypus: «Китай: провинция Чжили, окрестн. Пекина, горы Похуашань. 1850–1858, [fl.], С. И. Базилевский» (LE).

Syntypi: LE, Центр. Азия (см.: Илларионова, 2000).

По протологу: «Mongolia orient. et Tschili: 1) Chingan, decliv. orient. fl. Talyr, 19 VII 1889, leg. Potanin; 2) Alaschan, N 2014, leg. A. David; 3) circa Pekin, montes Po-chua-schan, leg. Basilevsky».

120. *S. potaninii* Pjlin, 1928, Изв. Главн. бот. сада СССР, 27, 1: 91.

Syntypi (2): «China borealis: prov. Tschili, к ю. от г. Баодин (Baoding). 31 V 1884, [fl.], G. N. Potanin» (LE).

Syntypus: «China borealis: prov. Tschili, дер. Фан-шун, к в. от г. Тан-чэн. 1 VI 1884, [fl.], G. N. Potanin» (LE).

По протологу: «China, Tschili: 1). prope urbem Bao-din, 31 V 1884, leg. Potanin; 2). prope urbem Lan-sjan, inter Pekin et Bao-din, 26 V 1884, leg. Potanin; 3). pag. Fan-schun non procul urb. Tan-tschen, 1 VI 1884, leg. Potanin; 4). prope Pekin, montes Pochuaschan, 1850-58, leg. Basilevsky; 5). Pekin, 1877, N 444, leg. Bretschneider; 6). Pekin, herb. Fischer; Schansi: 7). in valle fl. Schinsali, 5 V 1884, leg. Potanin».

121. *S. strangulata* Iljin, 1928, Изв. Главн. бот. сада СССР, 27, 1: 89. (= *Klasea strangulata* (Iljin) Kitag., 1950, Journ. Jap. Bot. 25: 40).

Syntypi (3): «China borealis: Szetschuan septentrionali, in valle fl. Peiho. 21 VII 1885, [fl.], G. N. Potanin» (LE).

Syntypi: «China borealis: Szetschuan septentrionali, перев. к сев. от города Вэйсянь. 14 X 1885, [fl.], G. N. Potanin»; «ibid., между Енор и Кан-чуань. 19 IX 1885, [fl.], G. N. Potanin»; «Kansu, [на пути от г. Вэй-Юань-сянь к г. Ти-Дао-Чжоу, правая (южная) половина долины Желтой реки]. 10 VI 1875, [veg.], Piasezky»; «China borealis: Kansu. Джони. 2 VI 1885, [veg.], G. N. Potanin» — (LE).

Syntypi: LE, Центр. Азия (см.: Илларионова, 2000).

По протологу: «Setschuan: 1) in valle fl. Peiho, 21 VII 1885, leg. Potanin; 2) trajectus ad septentr. ab urb. Vejsan, 14 X 1885, leg. Potanin; 3) inter Enor et Kan-tschan, 19 IX 1885, leg. Potanin; Kansu: 4) Kansu, 10 VI 1875, leg. Piasezky; 5) terra Tangutorum, Tschertynton (?), VIII 1872, leg. Przewalski; 6) regio Tangut, St. Cha-gomi in part. super. fl. Chuan-che, 22 VII 1880, № 434, leg. Przewalski; 7) circumjunctus urb. Sinin, Syn-tschen et templ. Tschejbsen etc., 22 VIII 1901, № 509, leg. Ladygin; 8) templum Tschorten-tan, 7 IX 1901, leg. Ladygin; 9) Dshoni, 1885, leg. Potanin».

Примечание. Уточнение места сбора данного растения П. Я. Пясецким в провинции Ганьсу приводится по описаниям его путешествия по Китаю (Пясецкий, 1880).

122. *Sonchus lactuoides* Bunge, 1833, Enum. Pl. China Bor.: 40.

Syntypus: «China. 1831, [fl.], Bunge» (LE).

По протологу: «hab. in subhumidis prope Kan-tai».

123. *Tanacetum delavayi* Franch. ex W. W. Smith, 1915, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 8: 345. (= *Hippolytia delavayi* (Franch. ex W. W. Smith) Shih fide C. Shih et G. X. Fu, 1983, in Fl. Reip. Pop. Sin. 76, 1: 90).

Syntypus: «Plants of E. Tibet and S. W. China. [fl.], N 3047, G. Forrest, ex Herb. Hort. Reg. Bot. Edin.» (LE).

По протологу: «Open rocky situations on mountain meadows on the eastern flank of the Lichiang Range, Yunnan. Lat. 27°25' N. Alt. 12 000–13 000 ft. Sept. 1906. G. Forrest. N 3047. Open rocky situations on mountain meadows on the eastern flank of the Lichiang Range, Yunnan. Lat. 27°35' N. Alt. 12 000 ft. Sept. 1910. G. Forrest. N 6557».

124. *T. salicifolium* Mattf., 1932, Journ. Arn. Arbor. 13: 407. (= *Ajania salicifolia* (Mattf.) Poljak., 1955, Бот. мат. (Ленинград) 17: 424).

Isotypus: «China, central Kansu, Lien hoa shan: among limestone rocks on summit, alt. 11500 ft. VII 1925, [fl.], N 12693, J. F. Rock» (LE).

По протологу: «Central Kansu: Lien hoa shan: among limestone rocks on summit, alt. 3450 m., n. 12693, Juli 1925».

125. *Taraxacum formosanum* Kitam., 1933, Acta Phytotax. Geobot. (Kyoto) 2: 48.

Isotypus: «Formosa: prov. Taihoku: Tamsui. 19 I 1932, [fl.], S. Kitamura» (LE).

По протологу: «Formosa: prov. Taihoku: Tamsui (19 Jan. 1932, S. Kitamura in Herb. Univ. Imp. Kioto)».

126. *Vernonia clivorum* Hance, 1869, Journ. Bot. (London) 7: 164.

Syntypus: «China, in ripis clivosis amnis «East River», ad fauces Shiuhing, prov. Cantoniensis. X 1867, [fl.], N 14734, T. Sampson, Herb. H. F. Hance» (LE).

По протологу: «In frutectis clivorum ad fauces Shiu-hing fluv. West River, prov. Cantonensis, mensibus Februario Octobrique a. 1867, collegit Th. Sampson (Exsicc. n. 14743)».

Примечание. В протологе или на гербарной этикетке указанного изотипа перепутаны цифры в номере сбора.

127. *V. sylvatica* Dunn, 1903, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 35: 501.

Syntypi: «China, Yunnan, Mengtze, S.E. mts. 5000'. [fl.], N 11051, A. Henry»; «ibid., Szemao, E. mts. 4500'. [fl.], N 11697 A, A. Henry»; «ibid., ...Bons d'Anty... Szemao... [fl.], N 11697, A. Henry» — (LE).

По протологу: «Yunnan: forests of the Red River at Mengtze from 6000 to 7000 ft., Hancock, 470; Mengtze and Szemao forests, 4500-5000 ft., A. Henry, 11051, 11697, 11697 A».

128. *Xanthorappus subacaulis* C. Winkl., 1893, Тр. Петерб. бот. сада 13: 11.

Syntypi: «China occidentalis, terra Tangutorum (prov. Kansu), кум. Чергын-тон. VIII 1872, [fl.], N 385, N. M. Przewalski»; «China, [между г. Лян-Чжоу-Фу и г. Шан-Дань-Сянь], на возвышенности близ входа в ущелье. 21 VII 1875, [fl.], Piasezky» — (LE).

По протологу: «Habitat in Chinae occidentalis provincia Kansu in terra Tangutorum. Augusto mense anni 1872 cl. Przewalsky genus novum detexit. Eandem plantam Julio mense anni 1875 cl. Piasezky in Mongolia inter Lian-dshu-fu et Schan-den-siang reperit».

Примечание. К типовым образцам приложен рисунок деталей строения растения, выполненный К. Винклером. Уточнение места сбора П. Я. Пясецким приводится по описаниям его путешествия по Китаю (Пясецкий, 1880).

Литература

- Илларионова И. Д. *Serratula* L. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). Под. ред. В. И. Грубова. СПб., 2000. С. 56–57.
- Илларионова И. Д. *Artemisia aurata* Kom. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Восточной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). Часть 1 (Япония и Корея). Под. ред. В. И. Грубова. М.; СПб., 2004. С. 37.
- Илларионова И. Д. *Saussurea umbrosa* Kom. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Восточной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). Часть 1 (Япония и Корея). Под. ред. В. И. Грубова. М.; СПб., 2004. С. 51.
- Имханицкая Н. Н. *Anaphalis* DC. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). Под. ред. В. И. Грубова. СПб., 2000. С. 24–25.
- К а т а л о г типовых образцов сосудистых растений Восточной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). Часть 1 (Япония и Корея). Под. ред. В. И. Грубова. М.; СПб., 2004. 188 с.
- Липшиц С. Ю. Род *Saussurea* DC. (*Asteraceae*) Л., 1979. 283 с.
- Попова Т. Н. *Carpesium* L. // Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). Под. ред. В. И. Грубова. СПб., 2000. С. 37–38.
- Пясецкий П. Я. Путешествие по Китаю в 1874–1875 гг. СПб., 1880. Т. 2. 1122 с.
- Bretschneider E. History of european botanical discoveries in China. London, 1898. 1167 p.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2
E-mail: ireneillar@yandex.ru