

Г. А. Лазьков

G. Lazkov

**GASTROLYCHNIS ALEXEENKOI LAZKOV  
(CARYOPHYLLACEAE) — НОВЫЙ ВИД  
ДЛЯ ФЛОРЫ ТАДЖИКИСТАНА**

**GASTROLYCHNIS ALEXEENKOI LAZKOV  
(CARYOPHYLLACEAE), A NEW SPECIES  
TO THE FLORA OF TAJIKISTAN**

Биолого-почвенный институт НАН Кыргызстана, лаборатория флоры  
720071, Бишкек, пр. Чуй, 265  
glazkov1963@mail.ru

Для Таджикистана впервые приводится вид *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov, описанный из Китая.

Ключевые слова: *Gastrolychnis alexeenkoi*, Таджикистан.

При определении гербарных материалов по семейству гвоздичных, собранных С. С. Иконниковым на Памире в Таджикистане, был обнаружен образец рода *Gastrolychnis* (Fenzl) Reichenb. При его определении оказалось, что он относится к новому для Таджикистана виду *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov. Этот вид был описан мною (Лазьков, 2003) недавно из сопредельных районов Китая. Этикетка имеющегося образца следующая: «Памир, оз. Ранг-Куль, долина Сары-Таш, восточный склон, закрепленная осыпь, № 4260, 27 VIII [19]57, Иконников».

Данный вид отличается от *G. brachypetala* более глубоким расщеплением пластинки лепестка и наличием зубцов по его сторонам, а также более крупным размером семян.

Ранее типовой образец *G. alexeenkoi*, хранившийся в Среднеазиатском секторе Гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), был неправильно определен как *G. brachypetala* (Hornem.) Tolm. et Kozhanczikov. Под этим неправильным названием вид приводится для сопредельных с Таджикистаном территорий Китая (Тогдумбаш-Памир) (Овчинников, 1968). Однако, судя по определениям на типовом образце *G. alexeenkoi*, еще О. А. Федченко рассматривала данные растения как особую разновидность. Сомневался в принадлежности этих растений к *G. (Melandrium) brachypetala* и П. Н. Овчинников (1968), предполагавший, что это особая памирская раса, которую он не выделил из-за недостатка материала.

О. Н. Бондаренко, судя по определению на листе, не считала данные растения за *Melandrium brachypetalum* (Hornem.) Fenzl и не приводила для Восточного Памира в «Определителе растений Средней Азии» (Бондаренко, 1971). Однако Ю. П. Кожевников (1994) в обработке гвоздичных для Центральной Азии, рассматривал их как *M. brachypetalum*. Ниже приведена номенклатурная цитата вида *Gastrolychnis alexeenkoi*.

*Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov, 2003, Бот. журн. 88, 6: 120, с рис. — *Melandrium brachypetalum* auct. non (Hornem.) Fenzl: Овч., 1968, во Фл. ТаджССР 3: 584, таб. 89, рис. 7, 8, р. р., quoad pl. ex Tagdumbach-Pamir; Ю. Кожевн., 1993, Раст. Центр. Азии 11: 87, р. р., quoad pl. ex Tagdumbach-Pamir.

Тип: «Flora Turkestanica Ex. 2837, Tagdumbach-Pamir (terra chinensis), ad junctionem fl. Kara-Czukur et Iik-su, in glareosis ripariis, № 584, 16 VII 1901, Alexeenko» (LE).

#### Литература

Бондаренко О. Н. Род *Melandrium* Roehl. — Дрёма // Определитель растений Средней Азии. Ташкент, 1971. Т. 2. С. 278–282. — Кожевников Ю. П. Сем. *Caryophyllaceae* Juss. // Растения Центральной Азии. СПб., 1994. Вып. 11. С. 13–116. — Лазьков Г. А. Новый вид рода *Gastrolychnis* (*Caryophyllaceae*) из Китая // Бот. журн. 2003. Т. 88. № 6. С. 119–122. — Овчинников П. Н. Род Дрёма — *Melandrium* Roehl. // Флора Таджикской ССР. Л., 1968. Т. 3. С. 577–593.

#### Summary

The species *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov earlier described from China is for the first time cited to the flora of Tajikistan.

Key words: *Gastrolychnis alexeenkoi*, Tajikistan.