

**О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ CORYDALIS GRACILIS LEDEB.  
(FUMARIACEAE)**

**ON INDEPENDENCE OF CORYDALIS GRACILIS LEDEB.  
(FUMARIACEAE)**

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Гербарий высших растений  
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2  
mem\_spb@mail.ru

Обоснована самостоятельность вида *Corydalis gracilis* Ledeb., дополнена морфологическая характеристика, приведены данные о типовом образце.

Ключевые слова: *Corydalis gracilis*, *C. bracteata*, *Fumariaceae*.

Хохлатка прицветниковая (*Corydalis bracteata* (Steph.) Pers.) встречается на опушках в лесах, чаще темнохвойных, в подгольцовых редколесьях, где предпочитает места с обильным увлажнением и богатыми слабо задернованными рыхлыми почвами, свойственна Западной и Восточной Сибири, встречается в Казахстане. Во «Флоре СССР» (Попов, 1937) и «Флоре Сибири» (Пешкова, 1994) этот вид приводится для Монголии, однако пока он там не найден. В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду БИН РАН *C. bracteata* одичала и в мае массово цветет, образуя яркие красочные аспекты.

Впервые на неоднородность вида *C. bracteata* обратил внимание К. Ф. Ледебур (Ledebour, 1842), выделив из него *C. gracilis* Ledeb., к которому отнес растения с цельнокрайными эллиптическими прицветниками с р. Енисей. Позже Н. А. Буш (1913) предложил комбинацию *C. bracteata* f. *gracilis* (Ledeb.) Busch. Авторы последующих обработок не признавали самостоятельность этого вида и приводили *C. gracilis* в качестве синонима *C. bracteata*.

На типовом образце *C. gracilis* (одно цветущее растение), хранящемся в Гербарии БИН РАН, рукой К. Ф. Ледебера написано: «*Corydalis gracilis mihi*. Lit. Dr. Stephan, 1820», а рядом находится еще одна этикетка — «*Jenisea ex herb. Gmelini*».

В сектор Сибири и Дальнего Востока осенью 2005 г. из дублетного сектора был передан материал Переселенческого управления, собранный в 1914 г. Н. И. Кузнецовым и В. В. Ревердатто у ст. Хантайское на р. Енисей (Кузнецов, 1916). В пачке находилось 167 растений, определенных как *C. bracteata*. Этот материал с севера Ту-

руханского края, на наш взгляд, позволяет пересмотреть объем вида *C. bracteata* и признать обоснованность выделения тундровых хохлаток в близкородственный, но самостоятельный вид *C. gracilis*, ареал которого в основном лежит за Полярным кругом. В связи с этим возникает вопрос, где собран типовый образец *C. gracilis*. Возможно, в 1739 г. Ф. Ф. Мюллер и И. Г. Гмелин, посетив окрестности Мангазеи (ныне г. Туруханск) (Бородин, 1908), собрали интересующий нас образец, который впоследствии попал к Ф. Х. Стефану, а им был послан Ледебурю.

Изученный нами материал Кузнецова и Ревердатто позволил расширить ряд признаков *C. gracilis* и дополнить его описание, которое приводим ниже.

***Corydalis gracilis* Ledeb. (sect. *Corydalis*).** — *Planta perennis*, 14–20 cm alt., tubere 0.5–0.8(1) cm in diam., subgloboso. Caulis solitarius, foliosus. Folium squamiforme tuberi arctissime (interdum 0.5–0.8 cm) dispositum. Folia caulina biternata, basale (petiolo) 2–5 cm lg. Inflorescentia — racemus terminalis, 2–3(4)-florus. Bractee late ellipticae, integerrimae, apice acutatae vel vix dentatae, rarissime lobatae, 4–11 mm lg., 3–9 mm lt. Pedicelli 6–8 mm lg. Corolla flava, (35)38–40(43) mm lg., in loco pedicelli insertione 4–6 mm lt. Petala externa limbo latissimo et emarginato; calcar 18–20 mm lg. Nectarium calcar 7–9 mm brevius.

Н о л о т и п у с (г о л о т и п): «*Jenisea ex herb. Gmelini*» (LE).

Растение многолетнее, 14–23 см выс., с округлым клубнем 0.5–0.8(1) см в диам. Стебель одиночный, облиственный. Чешуевидный лист расположен близко к клубню, иногда на расстоянии 0.5–0.8 см. Стеблевые листья дважды тройчатые, нижний стеблевой лист с черешком 2–5 см дл. Соцветие — верхушечная кисть с 2–3, очень редко 4 цветками. Прицветники широкоэллиптические, цельнокрайные, на верхушке заостренные или слабо зубчатые, крайне редко лопастные, 4–11 мм дл., 3–9 мм шир. Цветоножки 6–8 мм дл. Венчик желтый, (35)38–40(43) мм дл., 4–6 мм шир. в месте прикрепления цветоножки. Наружные лепестки с очень широким отгибом и выемкой в центре; шпорец 18–20 мм дл. Нектарник на 7–9 мм короче шпорца.

Р о д с т в о. От *C. bracteata* (Steph.) Pers. отличается малоцветковой кистью с 2–3 (а не 5–16) цветками, более крупным венчиком (36–40, а не 25–34 мм дл.), цельнокрайными или немного зубчатыми на верхушке прицветниками 7–11 мм дл. и 3–9 мм шир. (а не пальчато рассеченными, 15–35 мм дл., 10–25 мм шир).

## Литература

Бородин И. П. Коллекторы и коллекции по Флоре Сибири. СПб., 1908. 245 с. — Буш Н. А. Род Хохлатка — *Corydalis* DC. // Флора Сибири и Дальнего Востока. СПб., 1913. С. 30–71. — Кузнецов Н. И. Растительность Енисейской лесотундры // Предварительный отчет о ботанических исследованиях в Сибири и Туркестане в 1914 г. Петроград, 1916. С. 1–30. — Попов М. Г. Род Хохлатка — *Corydalis* DC. // Флора СССР. М.; Л., 1937. Т. 7. С. 649–705. — Пешкова Г. А. Род Хохлатка — *Corydalis* DC. // Флора Сибири. Новосибирск, 1994. С. 32–42. — Ledebour C. F. *Corydalis gracilis* Ledeb. // Flora Rossica. Stuttgartiae, 1842. Vol. 1. P. 97–106.

## Summary

The independence of the species *Corydalis gracilis* Ledeb. is proved; morphological characteristics are updated, and the data on the type specimen are provided.

Key words: *Corydalis gracilis*, *C. bracteata*, *Fumariaceae*.