

НОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РОДА *PYRUS* L. (ROSACEAE)  
ИЗ АРМЕНИИNEW VARIETIES OF THE GENUS *PYRUS* L. (ROSACEAE)  
FROM ARMENIA

Институт ботаники Национальной академии наук Республики Армения  
Отдел геоботаники  
Республика Армения, 0063, Ереван, ул. Ачаряна, 1  
akopian\_janna@inbox.ru

Приводятся описания четырех новых разновидностей рода *Pyrus* L. из Армении: *P. gergerana* Gladkova var. *macrophylla* Akopian var. nova, *P. salicifolia* Pall. var. *petiolaris* Mulk. ex Akopian var. nova, *P. takhtadzhianii* Fed. var. *macrophylla* Mulk. ex Akopian var. nova, *P. theodorovii* Mulk. var. *latifolia* Mulk. ex Akopian et Zamani var. nova.

Ключевые слова: *Pyrus*, новые разновидности, флора Армении.

В Гербарии Отдела систематики и географии растений Института ботаники НАН РА (ERE) хранятся образцы некоторых разновидностей, форм и гибридов рода *Pyrus* L., в основном выделенных Я. И. Мулкиджаняном, но не обнародованных. В результате изучения гербарного материала по роду *Pyrus*, сравнения с личными сборами и наблюдений в природе мы сочли необходимым описать следующие разновидности.

***Pyrus gergerana* Gladkova var. *macrophylla* Akopian var. nova.** — A varietate typica foliis valde majoribus (9 × 5 cm), late ovato-rhomboides, abrupte acuminatibus, margino undulatis differt. — От типовой разновидности отличается более крупными (9 × 5 см), широко яйцевидно-ромбовидными, наверху внезапно заостренными листьями с волнистыми краями.

**Holotypus:** «АрмССР, Даралагез, Азизбековский район, близ села Гер-Гер, на краю пашни у дороги на Джермук, 1500–1600 м над ур. м., дерево до 15 м выс., 28 VIII 1968, J. I. Mulkijanian» (ERE 144647). — Табл. I.

**Paratypi** (паратипы): К этой разновидности нами отнесены некоторые образцы («Армянская ССР, Даралагез, Чайкенд × Гергер, не доезжая до сел. Гергер 200 м, слева от дороги, 1600–1800 м над ур. м., обильно плодоносящее дерево № 1, 28 VIII 1968, Я. И. Мулкиджанян, А. А. Григорян, П. П. Гамбарян» — ERE 93815; «АрмССР, Даралагез, бассейн р. Элегиз, сел. Кавушуг × Кзыл Гел, у дороги, 27 VIII 1968, Я. И. Мулкиджанян» — ERE

93823), ранее определенные как *P. voronovii* Rubtzov (1941, Бот. мат. (Ленинград), 9, 1: 76), а также образцы намеченных Я. И. Мулкиджаняном *P. voronovii* f. *macrocarpa* Mulk. in sched. («АрмССР, Даралагез, Гер-гер, 28 VIII 1968, Я. Мулкиджанян, А. Григорян, П. Гамбарян» — ERE 144660, 144661) и *P. elata* Rubtzov var. *integrifolia* Mulk. in sched. («АрмССР, Даралагез, Азизбековский район, близ сел. Гер-Гер, на краю пашни у дороги на Джермук, 1500–1600 м над ур. м., 28 VIII 1968, Я. Мулкиджанян» — ERE 144647).

**Распространение.** Армения: Дарелегисский флористический район.

Отметим, что образцы, собранные Мулкиджаняном (ERE 93814, 93820, 93826, 144659) и определенные им как *P. voronovii* var. *angustifolia* Mulk. (Мулкиджанян, 1973) послужили для установления *P. gergerana* Gladkova (Гладкова, 1990).

***Pyrus salicifolia* Pall. var. *petiolaris* Mulk. ex Akopian var. nova.** — A varietate typica foliis petiolatis, petiolis ad 3 cm lg. differt. — От типовой разновидности отличается черешковыми листьями с черешками до 3 см дл.

**Holotypus:** «АрмССР, отрог Гегамских гор, окр. сел. Гелайсор, кустарниковые заросли, северный склон, 1700 м над ур. м., 8 IX 1966, J. Mulkijanian, V. Manakjan» (ERE 84115). — Табл. II.

**Paratypi** (паратипы): «Арташатский район, окрестности Гелайсор, 19 VI 1966, Я. Мулкиджанян» (ERE 87237, 92886), «Веди × Гелайсор, поlynная полупустыня, 14 VII 1964, Я. Мулкиджанян» (ERE 87309), «Даралагез, на реке Элегис, Кавушуг × Кзыл-гел, 28 VIII 1968, Я. Мулкиджанян» (ERE 92206), «Мегринский район, селения Личк × Легваз, 15 VII 1958, Я. Мулкиджанян» (ERE 92887), «Мегринский район, селения Личк × Легваз, 18 VII 1958, Я. Мулкиджанян» (ERE 92888), «Арташатский район, сел. Байбурт, 27 V 1959, А. Тахтаджян, Э. Габриэлян, Я. Мулкиджанян» (ERE 75743).

**Распространение.** Армения: Ереванский, Дарелегисский, Мегринский районы.

***Pyrus takhtadzhianii* Fed. var. *macrophylla* Mulk. ex Akopian var. nova.** — A varietate typica foliis majoribus (ad 9 × 4 cm) differt. — От типовой разновидности отличается крупными листьями (до 9 × 4 см).

**Holotypus:** «Армянская ССР, Даралагез, Микоянский район, влажное ущелье Аяр, 30 IX 1956, J. I. Mulkijanian» (ERE 149147). — Табл. III.

**Распространение.** Армения: Дарелегисский флористический район.

***Pyrus theodorovii* Mulk. var. *latifolia* Mulk. ex Akopian et Zamani var. nova.** — A varietate typica foliis majoribus et latioribus (7)8 ×

2.5(3.5) cm) differt. — От типовой разновидности отличается более крупными и широкими листьями (7)8 × 2.5(3.5) см).

**Holotypus:** «Армянская ССР, ущелье реки Азат, правый борт, близ монастыря Гегарт, южный каменистый склон, 1500–1600 м над ур. м., 27 VI 1969, J. I. Mulkijanian» (ERE 144658). — Табл. IV.

**Распространение.** Армения: Ереванский флористический район; Иран: зап.

### Литература

Гладкова В. Н. Новые таксоны рода *Pyrus* L. (*Rosaceae*) из Закавказья // Новости систематики высших растений. 1990. Т. 27. С. 69–73. — Мулкиджанян Я. И. Новые материалы к систематике груш Передней Азии // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1973. Т. 78, вып. 2. С. 145–146.

### Summary

Four new varieties of the genus *Pyrus* L. are described from Armenia: *P. gegerana* Gladkova var. *macrophylla* Akopian var. nova, *P. salicifolia* Pall. var. *petiolaris* Mulk. ex Akopian var. nova, *P. takhtadzhianii* Fed. var. *macrophylla* Mulk. ex Akopian var. nova and *P. theodorovii* Mulk. var. *latifolia* Mulk. ex Akopian et Zamani var. nova.

**Key words:** *Pyrus*, new varieties, Armenian flora.