

С. А. Мей. var. *koengii* (С. К. Schneid.) J. Wagner, 1910, Pflanzenareale, 4: 229; Медв. 1919, Дер. и куст. Кавк. изд. 3: 175. — *Thelycrania koenigii* (С. К. Schneid.) Sanadze, 1946, Тр. Тбил. унив. 29: 44; Поярк. 1951, Фл. СССР, 17: 334; Манден. 1964, Определ. раст. Груз. 1: 252; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 140.

Описан из Турции. Тур у с: «Transcaucasien, provinz Batum, in valle fl. Murgulsu, supra pagum Dsansula, 26 IX 1908, С. К. Schneider» (?).

**ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ; ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

## ORDO 58. EUCOMMIALES

Fam. 119. **EUCOMMIACEAE** Engl.\*

1 (4). **Eucommia** Oliv.

1 (6). **E. ulmoides** Oliv. 1890, in Hook. Icon. Pl. 20: tab. 1950.

Описан из Китая.

**ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх. (культурное); **ВЗ:** Н. Кур. (культурное); **Т** (культурное).

Указан для субтропической области Закавказья (Палибин, 1939: 273).

Европа (культурное); Вост. Азия (Китай).

## Superordo Aralianae

ORDO 59. ARALIALES (APIALES)

Fam. 120. **ARALIACEAE** Juss.\*\*

1 (5). **Hedera** L.

1 (7). **H. chrysocarpa** Walsh, 1826, Trans. Hort. Soc. London, 6: 42. — *H. poetarum* Bertol. 1827, Prael. Rei Herb.: 78. — *H. helix* L. var. *chrysocarpa* Ten. 1860, in Caruel, Fl. Tosc.: 300.

Описан из Турции («Constantinople, vicinity of Pera»).

**ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (8). **H. helix** L. 1753, Sp. Pl.: 202.

Описан из Европы.

2а. **H. helix** L. subsp. *caucasigena* (Pojark.) Takht. et Mulk. 1973, Фл. Арм. 6: 251. — *H. caucasigena* Pojark. 1950, Фл. СССР, 16: 587.

Описан из Западного Закавказья. Тур у с: «Сухум. округ, в лесах с. Юрьевского в 25 верстах от Сухума, на деревьях, 5 IX 1902. Ю. Воронов; Н. Ф. Р. № 1771» (LE!).

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.

\* В. В. Шванова.

\*\* Ю. Л. Меницкий.