

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗК:** В. Куб. (Галушко, 1978 : 38; Танфильев, Кононов, 1987: 9); **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978: 38; Михеев, 2000 : 212).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. и Южн. Африка.

2.(22). Ceterach Willd.

1.(48). **C. officinarum** Willd. 1804, Anleit. Selbststud. Bot. : 578. — *Asplenium ceterach* L. 1753, Sp. Pl. : 1080; Gabr. a. Greuter, 1984, Willdenowia, 14 : 149.

Описан из Франции.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., В. Куб. (Галушко, 1978 : 39), Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978 : 39; Танфильев, Кононов, 1987: 9; Михеев, 2000 : 212); **ВК:** Ассо-Арг. (Аскеров, 1977а : 1026; Очиаури, 1981 : 30); **ВЗ:** Ширв. (Апшерон) (Аскеров, 1977а : 1026); **ЮЗ:** Севан. (Тахтаджян, 1954 : 69; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 149, sub *Asplenium ceterach*).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр. Азия.

3.(23). Phyllitis Hill

1.(49). **P. scolopendrium** (L.) Newm. 1844, Hist. Brit. Ferns, ed. 2 : 10. — *Asplenium scolopendrium* L. 1753, Sp. Pl. : 1079; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1 : 57; Gabr. a. Greuter, 1984, Willdenowia, 14 : 150.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв. (Апшерон), Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур. (Геокчайский р-н), Караб. (окрестности г. Шуши); **ЮЗ:** Севан., Занг.; **Т.**

Указан для **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, 1954 : 69; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 150, sub *Asplenium scolopendrium*); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Аскеров, 1977а : 1026).

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Вост. Азия; Сев. Америка.

Fam. 12. Dryopteridaceae R.-C. Ching*

1.(24). Matteucia Tod.

1.(50). **M. struthiopteris** (L.) Tod. 1866, Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo, 1 : 235. — *Osmunda struthiopteris* L. 1753, Sp. Pl. : 1066. — *Struthiopteris filicastrum* All. 1785, Fl. Pedem. 2 : 283; Фомин, 1934, Фл. СССР, 1 : 29; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 10; Исаев, 1950, Фл. Азерб. 1 : 19; Дмитриева, 1960, Определ. раст. Адж. : 11; она же, 1990, Определ. раст. Адж., изд. 2, 1 : 9.

* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)

Описан из Швеции.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцихский р-н); **Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978 : 34); **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987: 9; Михеев, 2000 : 213); **ВК:** Ассо-Арг. (Аскеров, 1977а : 1027; Галушко, 1978: 34); **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Gabrieljan, Greuter, 1984: 154).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Вост. Азия.

2.(25). Onoclea L.

1.(51). **O. sensibilis** L. 1753, Sp. Pl.: 1062.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Адж. (натурализовался в Батумском ботаническом саду) (Дмитриева, 1990 : 9).

Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка.

3.(26). Athyrium Roth

1.(52). **A. filix-femina** (L.) Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3, 1 : 65. — *Polypodium filix-femina* L. 1753, Sp. Pl.: 1090. — *Asplenium filix-femina* (L.) Bernh. 1806, Journ. Bot. (Götting.) 1, 2: 26.

Описан из Европы.

ЗК; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т.**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Галушко, 1978 : 37; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан. (Gabrieljan, Greuter, 1984 : 152).

Европа; Сев., Ср., Юго-Зап. (Турция, Иран), Центр., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка.

2.(53). **A. distentifolium** Tausch ex Opiz, 1820, Tent. Fl. Crypt. Voem. 2, 1 : 14. — *A. alpestre* (Норре) Opiz, 1823, Voem. Phan. Cryptogr., Gew.: 116, non Clairv. 1811; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 107; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 57, cum auct. (Норре) Ryl. (1857); Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 10; он же, 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 24; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 30; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 28; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 25; Рзазаде, 1950, Фл. Азерб. 1 : 30; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1 : 53; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 15; она же, 1990, Опред. раст. Адж., изд. 2, 1 : 15; Долух. 1964, Опред. раст. Груз. 1 : 43; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавказ.: 19.

Описан из Европы.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.

Указан для **ЦК:** В. Тер. (Демурова, 1972 : 146; Сахокиа, Хуцишвили, 1975 : 34; Галушко, 1978 : 37; Комжа, 2001 : 111); **ВК:** Ман.-Самур. (Аскеров, 1977а : 1026); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Аскеров, 1982б : 23).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Вост. Азия; Сев. Америка.