

Указан для **ЗК**: Адаг-Пшиш. (Косенко, 1970 : 16; Галушко, 1978 : 34), В. Куб. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Демурова, 1972 : 145; Галушко, 1978 : 34; Комжа, 2001 : 111); **ЗЗ**: Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Долуханов, 1964 : 37; Гагнидзе, Кемуляриа-Натадзе, 1985 : 47).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Центр., Вост., Юго-Вост. Азия; Сев. Америка.

5.(58). **C. sudetica** A. Br. et Milde, 1855, Jahresb. Schles. Ges. Vaterl. Kult. 33 : 92. — *Rhizomatopteris sudetica* (A. Br. et Milde) A. Khokhr. 1985, Фл. Магадан. обл. : 347, 23.

Описан из Средней Европы.

ЗК: Бело-Лаб. (верховья р. Бакан), Уруп-Теб. (верховья рек Уруп и Теберда); **ЦК**: Малк. (Балкария — верховья р. Чегем).

Указан для **ЗК**: Адаг-Пшиш. (Галушко, 1978 : 34), В. Куб. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ЦК**: В. Кум. (Галушко, 1978 : 34; Михеев, 2000 : 213), В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг. (Галушко, 1978 : 34; Комжа, 2001 : 111); **ЗЗ**: Инг.-Рион. (Долуханов, 1964 : 37; Долуханов, Микеладзе, 1971 : 57–58).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Вост., Юго-Вост. Азия.

5.(28). *Gymnocarpium* Newm.

1.(59). **G. dryopteris** (L.) Newm. 1851, Phytologist, 4, 1 : 371; Долух. 1964, Опред. раст. Груз. 1 : 41. — *Polypodium dryopteris* L. 1753, Sp. Pl. : 1095. — *P. pulchellum* Salisb. 1796, Prodr. Stirp. : 403. — *Dryopteris linneana* C. Chr. 1906, Ind. Filic. : 275; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 68; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 43; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 22. — *D. pulchella* (Salisb.) Hayek, 1908, Fl. Steierm. 1 : 39; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 5. — *Thelypteris dryopteris* (L.) Sloss. 1917, in Rydberg, Fl. Rocky Mount. : 1044; Henders. 1965, Fl. Turk. 1 : 46. — *Dryopteris pumila* (Gilib.) V. Krecz. 1939, nom. invalid. : Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 19; он же, 1949, Опред. раст. Кавк. : 30; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 18; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж. : 11.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗК**: Адаг-Пшиш.; **ЦК**: В. Кум. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987 : 9; Михеев, 2000 : 213); **ВК**: Ман.-Самур. (Галушко, 1978 : 34; Аскеров, Раджи, 1980 : 92).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2.(60). **G. robertianum** (Hoffm.) Newm. 1851, Phytologist, 4, 1 : 371; Долух. 1964, Опред. раст. Груз. 1 : 41. — *Polypodium robertianum* Hoffm. 1796, Deutschl. Fl. 2 (App.) : 10. — *Phegopteris robertianum* (Hoffm.) A. Br. ex Aschers. 1859, Fl. Prov. Brandenb. 2 : 198. — *Dryopteris robertiana* (Hoffm.) C. Chr. 1905, Ind. Filic. : 289; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 70; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 44; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 5; он же, 1939, Фл. Кавк. изд. 2, 1 : 19; он же, 1949, Опред. раст. Кавк. : 30; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 23; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 19; Рзазаде, 1950, Фл. Азерб. 1 : 26.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Косенко, 1970 : 18; Галушко, 1978 : 34), В. Куб. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин. (Аскеров, 1977а : 1029, 1981 : 87; Галушко, 1978: 34).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев. Азия; Сев. Америка.

6.(29). *Polystichum* Roth, emend. Schott

1.(61). ***P. lonchitis*** (L.) Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3, 1 : 71. — *Polypodium lonchitis* L. 1753, Sp. Pl.: 1088.

Описан из Швейцарии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.- Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978 : 26; Танфильев, Кононов, 1987 : 9; Михеев, 2000 : 212); **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Аскеров, 1977а : 1027; Аскеров, Раджи, 1980 : 93); **ЮЗ:** Занг. (Gabrieljan, Greuter, 1984 : 155).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

2.(62). ***P. aculeatum*** (L.) Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3, 1 : 79. — *Polypodium aculeatum* L. 1753, Sp. Pl. : 1090. — *P. lobatum* Huds. 1763, Fl. Angl.: 390. — *Polystichum lobatum* (Huds.) Bast. 1809, Ess. Fl. Maine Loire : 367; C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr.: 83, emend. Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 79; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 48; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 9; он же, 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 22; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 30; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 27; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 22; Исаев, 1950, Фл. Азерб. 1 : 28; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1 : 39; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 14; она же, 1990, Опред. раст. Адж., изд. 2, 1 : 14; Долух. 1964, Опред. раст. Груз. 1 : 42; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавк.: 18.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак. (Галушко, 1978 : 36); **ВЗ:** Ширв. (Апшерон) (Аскеров, 1977а : 1027); **ЮЗ:** Занг. (Тахтаджян, 1954 : 39; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 155).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия; Центр. Африка.

Приводятся следующие гибриды *P. aculeatum* с кавказскими видами рода *Polystichum*:

P. x illyricum (Borb.) Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. lonchitis* x *P. aculeatum*).

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ;** **Т** (Аскеров, 1972б : 32, 1977а : 1027).

P. x bicknellii (Christ) Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. aculeatum* (= *P. lobatum*) x *P. setiferum* (= *P. angulare*)).

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Аскеров, 1977а : 1027); **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Лори; **Т** (Аскеров, 1972б : 32).