

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Косенко, 1970 : 18; Галушко, 1978 : 34), В. Куб. (Галушко, 1978 : 34; Танфильев, Кононов, 1987 : 9); **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин. (Аскеров, 1977а : 1029, 1981 : 87; Галушко, 1978: 34).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев. Азия; Сев. Америка.

6.(29). *Polystichum* Roth, emend. Schott

1.(61). ***P. lonchitis*** (L.) Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3, 1 : 71. — *Polypodium lonchitis* L. 1753, Sp. Pl.: 1088.

Описан из Швейцарии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.- Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1978 : 26; Танфильев, Кононов, 1987 : 9; Михеев, 2000 : 212); **ВК:** Ман.-Самур.; **ВЗ:** Мург.-Муровд. (Аскеров, 1977а : 1027; Аскеров, Раджи, 1980 : 93); **ЮЗ:** Занг. (Gabrieljan, Greuter, 1984 : 155).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

2.(62). ***P. aculeatum*** (L.) Roth, 1799, Tent. Fl. Germ. 3, 1 : 79. — *Polypodium aculeatum* L. 1753, Sp. Pl. : 1090. — *P. lobatum* Huds. 1763, Fl. Angl.: 390. — *Polystichum lobatum* (Huds.) Bast. 1809, Ess. Fl. Maine Loire : 367; C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr.: 83, emend. Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 79; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 48; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 9; он же, 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 22; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 30; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 27; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 22; Исаев, 1950, Фл. Азерб. 1 : 28; Тахт. 1954, Фл. Арм. 1 : 39; Дмитриева, 1960, Опред. раст. Адж.: 14; она же, 1990, Опред. раст. Адж., изд. 2, 1 : 14; Долух. 1964, Опред. раст. Груз. 1 : 42; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавк.: 18.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак. (Галушко, 1978 : 36); **ВЗ:** Ширв. (Апшерон) (Аскеров, 1977а : 1027); **ЮЗ:** Занг. (Тахтаджян, 1954 : 39; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 155).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия; Центр. Африка.

Приводятся следующие гибриды *P. aculeatum* с кавказскими видами рода *Polystichum*:

P. x illyricum (Borb.) Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. lonchitis* x *P. aculeatum*).

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ;** **Т** (Аскеров, 1972б : 32, 1977а : 1027).

P. x bicknellii (Christ) Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. aculeatum* (= *P. lobatum*) x *P. setiferum* (= *P. angulare*)).

Указан для **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур. (Аскеров, 1977а : 1027); **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Лори; **Т** (Аскеров, 1972б : 32).

3.(63). **P. kadyrovii** A. Askerov et A. Bobr. 1972, Бот. журн. 57, 10 : 1297.
Описан из Тальша. Тип: «Talysh, Lenkoran, ad austrem a silva Khanbulani; 8.
VI. 1970, leg. A. Askerov» (ВАК).

Указан для **T** (Аскеров, Бобров, 1972а : 1297).

Эндемик.

4.(64). **P. setiferum** (Forsk.) T. Moore ex Woyнар, 1913, Mitt. Naturw. Ver. Steierm. 49 : 181. — *Polypodium setiferum* Forsk. 1775, Fl. Aegypt.-Arab. : 185. — *Aspidium angulare* Kit. ex Willd. 1810, Sp. Pl. ed. 5, 1 : 257. — *Polystichum angulare* (Kit. ex Willd.) C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr.: 83; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1: 89, cum auct. (Presl) Fomin; он же, 1934, Фл. СССР, 1 : 47; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1: 9; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 24.

Описан из Турции: («Ad Dardanellos, Forskåhl»).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **T**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (ст. Темнолесская) (Танфильев, Кононов, 1987 : 9);

ЗЗ: Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемуляриа-Натадзе, 1985 : 47); **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Гадрутский р-н) (Аскеров, 1977а : 1027).

Сев., Центр., Юго-Вост. (Керчь) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

5.(65). **P. braunii** (Spenn.) Fée, 1852, Mém. Fam. Foug. 5 (Gen. Fil.) : 278. — *Aspidium braunii* Spenn. 1825, Fl. Friburg. 1 : 9, tab. 2.

Описан из Европы.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Галушко, 1978 : 37); **ЗК**: Бело-Лаб. (Косенко, 1970 : 18; Семагина, 1999 : 8); **ВЗ**: Алаз.-Агрнич. (Аскеров, 1977в : 52); **T** (Аскеров, 1977а : 1028).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Вост. Азия; Сев. Америка.

Приводятся следующие гибриды *P. braunii* с кавказскими видами рода:

P. x wirtgenii Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. braunii* x *P. setiferum*).

Указан для **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **T** (Аскеров, 1972б : 32, 1977а : 1028).

P. x safarovii A. Askerov et A. Bobr. 1972, Бот. журн. 57, 10 : 1298 (*P. braunii* x *P. woronowii*).

Указан для **T** (Аскеров, Бобров, 1972а : 1298).

P. x luerssenii (Christ) Nahne, 1904, Allg. Bot. Zeitschr. 10 : 103 (*P. braunii* x *P. aculeatum*).

Указан для **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **T** (Аскеров, 1977а : 1028); **ЗЗ**: Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., **T** (Аскеров, 1972б : 32).

6.(66). **P. woronowii** Fomin, 1910, Вестн. Тифл. бот. сада, 18 : 21.

Описан по материалам из Абхазии, Аджарии и Тальша: («Habitat in Abchasia prov. Suchum, prope Zebelda . . . X [19]09. . . G. Woronow! Prov. Batum, fauces Bechlevan in sylvis umbrosis . . . 16. VIII. 1910. spor. G. Woronow; Prov. Batum, Adsharia inferior . . . 24. VI 1910, G. Woronow! Talysch, prope Lenkoran, . . . Hohenacker; Talysch, fauces flum. Astara . . . 23. XII [19]09, A. Schelkownikow et A. Kaznakow!»).

Лектотип (Фомин, 1934 : 47; Кудряшова, 2000 : 158): «Abchasia prov. Suchum, prope Zebelda, fauces Pezkir, X [19]09 spor. et ster. G. Woronow (ТВИ)»; Топотип,

G. Woronow, X 1910, det. A. Fomin — LE!; Синтип: «Lenkoran et in montibus p. Astara, Hohenaker, 1836» (LE!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

Приводятся следующие гибриды *P. woronowii* с кавказскими видами рода *Polystichum*:

Р. х fominii A. Askerov et A. Bobr. 1972, Бот. журн. 57, 10 : 1298 (*P. woronowii* х *P. aculeatum*).

Указан для **Т** (Аскеров, Бобров, 1972а : 1298; Аскеров, 1977а : 1028).

Р. х dmitrieviae A. Askerov, 1983, Докл. АН АзССР, 39, 3 : 61 (*P. woronowii* х *P. setiferum*).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Аскеров, 1983б : 61).

7.(30). Cyrtomium C. Presl

1.(67). **C. falcatum** (L. f.) C. Presl, 1836, Tent. Pteridogr. : 86. — *Polypodium falcatum* L. f. 1781, Suppl. : 446. — *Cyrtomium fortunei* auct. non J. Sm. 1866: Хохряков, 1994, Бюл. Главн. бот. сада, 169: 23.

Описан из Восточной Азии.

ЗЗ: Адж. (натурализовался в Батумском ботаническом саду и окрестностях) (Дмитриева, 1990 : 14).

Вост., Южн., Юго-Вост. Азия; Южн. Африка.

8.(31). Dryopteris Adans. s. str.

1.(68). **D. liliana** Golits. 1933, Feddes Repert. 31 : 388. — *D. aemula* subsp. *liliana* (Golits.) A. Askerov, 1982, Докл. АН АзССР, 38, 9 : 60; Аскеров, 1983, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 39 : 6.

Описан из Юго-Западного Закавказья: «Hab. in fissuris montium humidis silvis umbrosis regionis inferioris Transcaucasiae austro-occidentalis».

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция, Лазистан).

2.(69). **D. dilatata** (Hoffm.) A. Gray, 1848, Man. Bot. North. U.S.: 631; Фомин, 1911, Матер. фл. Кавк. 1, 1 : 61; Гроссг. 1928, Фл. Кавк. 1 : 8; Henders., 1965, Fl. Turk. 1 : 59; Колак. 1980, Фл. Абх., изд. 2, 1 : 30. — *Polypodium dilatatum* Hoffm. 1796, Deutschl. Fl. 2 : 7. — *D. austriaca* (Jacq.) Wouynar ex Schinz et Thell. 1915, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 60 : 339; Фомин, 1934, Фл. СССР, 1 : 41; Колак. 1938, Фл. Абх. 1 : 21; Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 15; он же, 1949, Определ. раст. Кавк. : 30; Сосн. 1941, Фл. Груз. 1 : 17; Дмитриева, 1960, Определ. раст. Адж. : 14; она же, 1990, Определ. раст. Адж., изд. 2, 1 : 12; Долух. 1964, Определ. раст. Груз. 1 : 40; Косенко, 1970, Определ. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавк. : 17; Долух., Микеладзе, 1971, Фл. Груз., изд. 2, 1 : 80. — *D. assimilis* auct. non S. Walker, 1961 : Галушко, 1978, Фл. Сев. Кавк. 1 : 35. — *D. lanceolatocristata* auct. non (Hoffm.) Alst. 1954: Галушко, 1978, цит. соч. : 35. — *D. expansa* auct. non (C. Presl) Fr.-Jenk. et Jermy, 1977 : Аскеров, 1983, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 39: 6.

Описан из Центральной Европы.

ЗК; ЦК; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.