

С. А. Мей. var. *koengii* (С. К. Schneid.) J. Wagner, 1910, Pflanzenareale, 4: 229; Медв. 1919, Дер. и куст. Кавк. изд. 3: 175. — *Thelycrania koenigii* (С. К. Schneid.) Sanadze, 1946, Тр. Тбил. унив. 29: 44; Поярк. 1951, Фл. СССР, 17: 334; Манден. 1964, Определ. раст. Груз. 1: 252; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 140.

Описан из Турции. Тур у с: «Transcaucasien, provinz Batum, in valle fl. Murgulsu, supra pagum Dsansula, 26 IX 1908, С. К. Schneider» (?).

ЗК: Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ; ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

ORDO 58. EUCOMMIALES

Fam. 119. **EUCOMMIACEAE** Engl.*

1 (4). **Eucommia** Oliv.

1 (6). **E. ulmoides** Oliv. 1890, in Hook. Icon. Pl. 20: tab. 1950.

Описан из Китая.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх. (культурное); **ВЗ:** Н. Кур. (культурное); **Т** (культурное).

Указан для субтропической области Закавказья (Палибин, 1939: 273).

Европа (культурное); Вост. Азия (Китай).

Superordo Aralianae

ORDO 59. ARALIALES (APIALES)

Fam. 120. **ARALIACEAE** Juss.**

1 (5). **Hedera** L.

1 (7). **H. chrysocarpa** Walsh, 1826, Trans. Hort. Soc. London, 6: 42. — *H. poetarum* Bertol. 1827, Prael. Rei Herb.: 78. — *H. helix* L. var. *chrysocarpa* Ten. 1860, in Caruel, Fl. Tosc.: 300.

Описан из Турции («Constantinople, vicinity of Pera»).

ЗЗ: Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (8). **H. helix** L. 1753, Sp. Pl.: 202.

Описан из Европы.

2а. **H. helix** L. subsp. **caucasigena** (Pojark.) Takht. et Mulk. 1973, Фл. Арм. 6: 251. — *H. caucasigena* Pojark. 1950, Фл. СССР, 16: 587.

Описан из Западного Закавказья. Тур у с: «Сухум. округ, в лесах с. Юрьевского в 25 верстах от Сухума, на деревьях, 5 IX 1902. Ю. Воронов; Н. Ф. Р. № 1771» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.

* В. В. Шванова.

** Ю. Л. Меницкий.

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 237); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1932: 108; Манденова, 1964: 254).

Эндемик?

D. F. Chamberlain (1972: 538) для флоры Турции приводит только *H. helix* L. Этот подвид отличается от типового преобладанием на стерильных побегах стреловидных листьев (с удлинённой верхней лопастью) и более мелкими (2–2.5 мм дл.) лепестками.

3 (9). **H. colchica** (C. Koch) C. Koch, 1859, Wochenschr. Gärtn. Pflanzenk. 2: 74. — *H. helix* L. var. *colchica* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 365. — *H. rhombifolia* Rupr. ex Regel, 1860, Gartenflora, 9: 372.

Описан с Кавказа без указания местообитания («in itinere per Caucassum, Georgiam, Armeniaque...»).

ЗК: Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб.; **СЗЗ**: Пшад.-Джубг.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. Юго-Зап. Азия (Турция).

4 (10). **H. pastuchowii** Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 217; id. 1920, Beih. Bot. Centralbl. 43: 19, nom. nud.; Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 108. — *H. helix* auct. non L.: С. А. Мей. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 98, p. p.

Описан по материалам с Восточного Кавказа и из Талыша. *Lectotypus* (Menitsky, hoc loco): «Вост. Кавказ, Кубинск. у., ст. Кусар-чай, в лесу, IX 1927, Г. Г. Гушин» (LE!).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **Т**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1980: 237); **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд. (Воронов, 1933: 217).

Юго-Зап. Азия (Иран).

Отличается от предыдущего вида более тонкими (бумажистыми, а не кожистыми) и узкими, обычно ромбическими листьями генеративных побегов, в отличие от *H. colchica*, лишенными запаха и более короткими (до 0.7 мм дл.) и узкими зубцами чашечки.

Fam. 121. **APIACEAE** Lindl.*

Subfam. 1. **HYDROCOTYLOIDEAE** Drude

1 (6). **Hydrocotyle** L.

1 (11). **H. ramiflora** Maxim. 1887, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 31: 46.

Описан из Японии.

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЮЗ**: Ерев.

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Вост. Азия.

2 (12). **H. ranunculoides** L. f. 1781, Sp. Pl. Suppl.: 177. — *H. natans* Cirillo, 1788, Pl. Rar. Neapol. 1, 20: tab. 6.

Описан из Мексики.

ЗЗ: Адж.; **Т**.

Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран); Африка (троп.); Сев., Центр., Южн. Америка.

* Ю. Л. Меницкий.