

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Тамамшян, 1967: 30, карта 23; Галушко, 1980: 249; Танфильев, Кононов, 1987: 74); **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990: 149).

Эндемик.

13 (42). **C. crinitum** Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 63. — *C. pauciradiatum* Rech. f. 1952, Symb. Bot. Upsal. 11, 5: 27.

Описан по материалам из северного Ирана и восточной Турции. *Syn typi*: «Gilan, m. Savalan, № 4617, Aucher; Cappadocia ad Euphratem, № 3610, Aucher» (G, K, P, BM).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб. (Тамамшян, 1967: карта 19).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, сев.-зап. Иран).

14 (43). **C. bulbosum** L. 1753, Sp. Pl.: 258. — *C. caucasicum* (Hoffm.) Schischk. 1950, Фл. СССР, 16: 114. — *C. bulbosum* L. var. *caucasicum* Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 35.

Описан из Центральной Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ;** Т.

Указан для всех районов Азербайджана (Карягин, 1955: 580).

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (сев. и сев.-вост. Турция, сев. Иран), Ср. (Туркмения) Азия; заносное в Сев. Америке.

15 (44). **C. prescottii** DC. 1830, Prodr. 4: 225.

Описан с Алтая.

ЗП: З. Ставр.; **ЦК:** В. Кум.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Тамамшян, 1967: 27), Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 249); **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан. (Тамамшян, 1967: 27).

Сев., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. (Казахстан), Центр. Азия.

10 (15). **Grammosciadium** DC.

1 (45). **G. daucoides** DC. 1829, Coll. Mém. 5: 62. — *G. aucheri* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 67. — *G. szowitsii* Boiss. 1844, l. c.: 67.

Описан с «Востока». *Lectotypus* (Виноградова, 1970: 55, «*typus*»): «*Murrhis armena foliis Mei seu Foeniculi semine brevi*. Herb. Tournefort» (P).

ВЗ: Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Тамамшян, 1967: 32).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Иран).

2 (46). **G. platycarpum** Boiss. et Hausskn. 1872, in Boiss. Fl. Or. 2: 901. — *Saropodium platycarpum* (Boiss. et Hausskn.) Schischk. 1923, Бот. мат. (Ленинград), 4: 30.

Описан по материалам из Турции, Ирана и Ирака. *Lectotypus* (Виноградова, 1970: 54, «*typus*»): «*In monte Berythdagh Cataoniae alt. 6000'*, Haussknecht» (G; *isolectotypi* — K, P, W).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, сев., сев.-зап. и зап. Иран).

11 (16). *Anthriscus* Pers.

1 (47). **A. nemorosa** (Bieb.) Spreng. 1813, Pl. Umb. Prodr.: 27. — *Chaerophyllum nemorosum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 232. — *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. var. *nemorosa* (Bieb.) Trautv. 1877, Тр. Петерб. бот. сада, 5: 437.

Описан из бассейна Терека («in sylvis ad fluvium Terek sub arboribus frequentis»).

ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ; Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Тамамшян, 1967: 34).

Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, сев. Ирак, сев., сев.-зап. и зап. Иран), Ср., Центр., Южн. (Кашмир, Гималаи) Азия.

2 (48). **A. sylvestris** (L.) Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 40. — *Chaerophyllum sylvestre* L. 1753, Sp. Pl.: 258. — *Anthriscus lamprocarpa* auct. non Boiss.: Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 34.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Тамамшян, 1967: 34; Танфильев, Кононов, 1987: 74);

ВК: Ман.-Самур.; всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 251); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т** (Тамамшян, 1967: 34).

Атл., Сев., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция, сев. Иран) Азия; заносное в Вост., Южн. Азии (от Гималаев до Японии), троп. Африке и Сев. Америке.

3 (49). **A. velutina** Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 73.

Описан с Западного Кавказа. Турус: «In alta valle fluminis Tieberda, ditionis Kubanensis, 1500 m, 31 VIII, S. et L.» (Fl?).

ЗК: Уруп-Тeb.

Указан для **ЗЗ** (Шишкин, 1950: 130).

Эндемик.

Возможно, наиболее характерной особенностью *A. velutina* являются не опушенные листья, а невысокий, извилистый стебель, искривленный под влиянием движущихся осыпей, на которых этот вид обитает. В ЦК: Малк. встречаются гололистные формы *A. velutina*, обычно определяемые как *A. nemorosa* (Bieb.) Spreng.

4 (50). **A. ruprechtii** Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 914.

Описан по материалам с Центрального и Восточного Кавказа. Syn t y p i: «In alpinis Caucasi, ditio Pschawia ad lacum Tane et mons Antschabala ditionis Bogos, 8000–9000', Ruprecht» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

5 (51). **A. kotschyi** Fenzl ex Boiss. et Bal. 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 5: 102. — *A. sosnovskyi* Schischk. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 157.