

Указан для **ЗК**: Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 74); **ВЗ**: Н. Кур. (Ахундов, 1955: 389).

Центр., Южн. Европа; Средиз.

7 (61). **S. grandiflora** L. 1753, Sp. Pl.: 257. — *S. falcata* Londe, 1806, Mém. Soc. Nat. Moscou, 1: 57. — *S. australis* L. subsp. *grandiflora* (L.) Thell. 1926, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 2: 1035.

Описан с «Востока».

СЗЗ: Анап.-Гел.

Указан для **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 251).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Сирия, ? Ливан, ? зап. Иран).

13 (18). **Osmorhiza** Raf.

1 (62). **O. aristata** (Thunb.) Rydb. 1894, Bot. Surv. Nebraska, 3: 37. — *Chaerophyllum aristatum* Thunb. 1784, Fl. Jap.: 119.

Описан из Японии.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.

Сев., Вост., Южн. Азия.

Trib. 3. **Caucalieae** W. D. J. Koch

14 (19). **Torilis** Adans.

1 (63). **T. japonica** (Houtt.) DC. 1830, Prodr. 4: 219. — *Caucalis japonica* Houtt. 1777, Handl. Pl.-Kruiddk. 8: 42. — *Tordylium anthriscus* L. 1753, Sp. Pl.: 243. — *Torilis anthriscus* (L.) C. C. Gmel. 1805, Fl. Bad. 1: 168, non Gaertn. 1788. — *T. persica* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 102.

Описан из Японии.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин;

ЗЗ; **ЦЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Занг.; **Т**.

Указан для всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 252); **ВП**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ВЗ**: Караб.; **ЮЗ**: Мерг.-Зан. (Тамамшян, 1967: 42).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан); заносное в Вост. и Южн. Азии, Сев. и Южн. Америке.

2 (64). **T. ucrainica** Spreng. 1820, in Roem. et Schult. Syst. Veg. 6: 485. — *T. microcarpa* Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 43.

Описан из Украины.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Тамамшян, 1967: 42); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Гроссгейм, 1932: 134).

Вост. Европа.

3 (65). **T. arvensis** (Huds.) Link, 1821, Enum. Pl. Horti Berol. Alt. 1: 265. — *Caucalis arvensis* Huds. 1762, Fl. Angl.: 99. — *Scandix infesta* L. 1767, Syst. Nat. ed. 12,