

3 (13). *H. verticillata* Thunb. 1798, Diss. Hydrocot.: 2, 5. — *H. vulgaris* auct. non L.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 118; Бобр. 1950, Фл. СССР, 16: 58, quoad pl. cauc.; Тамамш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 14.

Описан, по-видимому, из Африки. Lectotypus (Menitsky, hoc loco): Thunb. 1798, l. c.: 8, icon. *H. verticillata*.

ЗЗ: Инг.-Рион., Адж.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Юго-Зап. (сев. Иран), Вост. Азия; троп., Южн. Африка; Сев., Южн. Америка; Австралия.

2 (7). *Centella* (L.) Urb.

1 (14). *C. asiatica* (L.) Urb. 1897, in Mart. et Eichl. Fl. Brasil. 11, 1: 287. — *Hydrocotyle asiatica* L. 1753, Sp. Pl.: 234.

Описан из Индии.

ЗЗ: Адж.

Юго-Зап. (сев. Иран, Пакистан), Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; троп., Южн. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия.

Subfam. 2. SANICULOIDEAE Drude

Trib. 1. Saniculeae Drude

3 (8). *Sanicula* L.

1 (15). *S. europaea* L. 1753, Sp. Pl.: 235.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), Южн. Азия; троп., Южн. Африка.

4 (9). *Astrantia* L.

1 (16). *A. major* L. 1753, Sp. Pl.: 235.

Описан по материалам из Швейцарии, Италии и с Пиренеев.

1а. *A. major* L. subsp. *major*. — *A. major* L. subsp. *eu-major* I. Grinț. 1910, Monogr. Astrantia: 88.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа.

1б. *A. major* L. subsp. *biebersteinii* (Trautv.) I. Grinț. 1910, Monogr. Astrantia: 150. — *A. biebersteinii* Trautv. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 2: 28. — *A. trifida* Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 8. — *A. caucasica* Spreng. 1818, Sp. Umb.: 17. — *A. intermedia* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 194. — *A. neglecta* C. Koch et S. D. Bouché, 1853, App. Sem. Horti Berol.: 22. — *A. colchica* Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 100. — *A. ossica* Woronow, 1905, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 6: 68. — *A. orientalis* Woronow 1905, цит. соч.: 68.