

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 256); **СЗЗ** (Тамамшян, 1967: 53); **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Нах. (Ахундов, 1955: 408; Тамамшян, 1967: 53).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; заносное в Сев. и Центр. Америке.

27 (32). *Eleutherospermum* C. Koch

1 (89). **E. cicutarium** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 924. — *Smyrniium cicutarium* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 239. — *Physospermum cicutarium* (Bieb.) Spreng. 1813, Pl. Umb. Prodr.: 23. — *Ligusticum caucasicum* Willd. ex Roem. et Schult. 1820, Syst. Veg. 6: 457, nom. nud., pro syn. *Physospermum cicutarium*. — *Eleutherospermum grandifolium* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 31. — *E. chrysanthum* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 74. — *Pleurospermum cicutarium* (Bieb.) Drude, 1898, in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3, 8: 172.

Описан с Кавказа. Т у р у s: «Ad fluvium Alazonium Cachetiae, Steven» (?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.; **Т.**

Указан для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 256); **ВЗ:** Караб. (Ахундов, 1955: 409; Тамамшян, 1967: 53); **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тамамшян, 1967: 53).

Юго-Зап. Азия (сев. и вост. Турция, сев. Иран).

2 (90). **E. lazicum** Boiss. et Bal. ex Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 924. — *Tamamschjania lazica* (Boiss. et Bal.) Pimenov et Kljuykov, 1981, Бот. журн. 66, 10: 1491, quoad typum. — *Ligusticum lazicum* (Boiss. et Bal.) Menitsky 1991, Бот. журн. 76, 12: 1759, quoad typum.

Описан из Турции. Т у р у s: «Lazistan, près de Khabakhar, 2700 m, 1 IX 1866, V. Balansa» (G; isotypus — P).

ЗЗ: Инг.-Рион.

Юго-Зап. Азия (Турция).

28 (33). *Trachidium* Lindl.

1 (91). **T. lehmannii** (Bunge) Benth. et Hook. f. 1867, Gen. Pl. 1: 884. — *Eremodaucus lehmannii* Bunge, 1843, Delect. Sem. Horto Dorpat.: 6.

Описан из Средней Азии.

ВЗ: Ширв. (заносное в окр. г. Баку).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

29 (34). *Lecokia* DC.

1 (92). **L. cretica** (Lam.) DC. 1829, Coll. Mém. 5: 67. — *Cachrys cretica* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 259.

Описан с о. Крит.

Т.

Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап., вост. и южн. Турция, зап. Сирия, Ливан, сев. Иран).

30 (35). *Cachrys* L.

1 (93). *C. microcarpa* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 113. — *C. crispa* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 311. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. microcarpum* (Bieb.) Petrov, 1940, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 11: 30. — *Bilacunaria microcarpa* (Bieb.) Pimenov et V. N. Tichom. 1983, Feddes Repert. 94, 3-4: 152.

Описан с Восточного Кавказа («ad margines lapidosos rivorum in montosis inter Kuba et Schemachiam»).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗП; ВП; ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 256); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Тамамшян, 1967: 56).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост., вост. и южн. Турция, сев.-зап. Иран, сев. Ирак, Ливан).

2 (94). *C. longiloba* DC. 1830, Prodr. 4: 237. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. var. *longilobum* (DC.) C. A. Mey ex Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. longilobum* (DC.) V. Fedtsch. ex Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 221 («*longifolium*»).

Описан из северного Ирана. Т у р у s: «In rupestribus ad Seidkhodzi prov. Aderbeidjan Persiae, Szowits» (G-DC?).

ВК: Ман.-Самур.; ? **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

3 (95). *C. caspica* (DC.) Menitsky, 1991, Бот. журн. 76, 12: 1754. — *Echinophora caspica* DC. 1830, Prodr. 4: 235. — *Cachrys amplifolia* Ledeb. 1831, in Eichw. Pl. Nov. It. Casp.-Cauc.: 6. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. var. *crassilobum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. caspicum* (DC.) Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 221. — *Bilacunaria caspica* (DC.) Pimenov et V. N. Tichom. 1983, Feddes Repert. 94, 3-4: 152 («*caspia*»).

Описан из Восточного Закавказья. Т у р у s: «Ad mare Caspium prope Salian, Hansen» (G-DC?).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.

Эндемик?

31 (36). *Prangos* Lindl.

1 (96). *P. acaulis* (DC.) Bornm. 1935, Feddes Repert. 39: 122. — *Cachrys acaulis* DC. 1830, Prodr. 4: 238. — *Prangos szowitsii* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 78.

Описан из северо-западного Ирана. Т у р у s: «In collibus ad lacum Ormiah in Aderbeidjan, Szowits» (G-DC; isotypus — G-BOISS).