

2 (126). **T. kitaibelii** Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 246, s. str., quoad pl. taur.; Шишк. 1950, Фл. СССР, 16: 357. — *Pimpinella ramosissima* Fisch. ex Trevir. 1819, Index Sem. Horto Wratisl.: 3. — *Trinia ramosissima* (Fisch. ex Trevir.) Rchb. 1832, Excursionsfl.: 474, non Ledeb. 1829.

Описан из Крыма. *Leototypus* (Menitsky, hoc loco; Шишкин, 1950: 358, «тип»): «Tauria, Steven» (LE!).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЦК:** В. Кум.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 260); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Тамамшян, 1967: 69, карта 74).

Юго-Вост. Европа (Крым).

3 (127). **T. leiogona** (C. A. Mey.) V. Fedtsch. 1915, Переч. раст. Турк.: 608. — *Rumia leiogona* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 125. — *Trinia scabra* Boiss. et Noë, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 2: 73. — *T. hispida* Hoffm. subsp. *leiogona* (C. A. Mey.) Fedoronchuk, 1978, Бот. журн. 63, 4: 613. — *Pimpinella dioica* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 242.

Описан из Тальша («in montibus altioribus Talüsch (alt. 800–1000 hexar.)»).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Белолаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг. (Тамамшян, 1967: 69; Танфильев, Кононов, 1987: 75); для всех районов Азербайджана (Ахундов, 1955: 435).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

4 (128). **T. hispida** Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 94. — *T. hoffmannii* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 244.

Описан с нижней Волги («ad coloniam Sareptanam»).

ЗП; ВП: Тер.-Кум.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 260; Танфильев, Кононов, 1987: 75); Тер.-Сулак. (Галушко, 1980: 260).

Вост., Юго-Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

35 (40). **Szovitsia** Fisch. et C. A. Mey.

1 (129). **S. callicarpa** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 39.

Описан из Южного Закавказья. *Typus*: «E prov. Karabagh oriental, Szovits» (LE!; *isotypi* — K, W).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

36 (41). **Aphanopleura** Boiss.

1 (130). **A. trachysperma** Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 855.

Описан из Южного Закавказья. *Typus*: «In desertis salsis ad Nackitschewan Armeniae Rossiae (Szov.)» (G; *isotypus* — LE!).

ЮЗ: Ерев., Нах., Занг.

Эндемик.

2 (131). **A. zangelanica** Gogina et A. E. Matzenko 1975, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 98: 56.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Азербайджанская ССР, Зангеланский р-н, ущелье реки Аракс, между селениями Минджеван и Агбент, 12 V 1971, Е. Гогина и А. Маценко» (МНА).

Указан для **ЮЗ**: Мерр.-Зан. (Гогина, Маценко, 1975: 56).

Эндемик.

37 (42). **Froriepia** C. Koch

1 (132). **F. subpinnata** (Ledeb.) Baill. 1879, Hist. Pl. 7: 220. — *Bupleurum subpinnatum* Ledeb. 1831, in Eichw. Pl. Nov. It. Casp.-Cauc.: 13, tab. 11. — *Froriepia nuda* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 362. — *Petroselinum segetum* Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 242, non W. D. J. Koch.

Описан из Ирана («in Astrabadensior»). Л е с т о т у р у s (Menitsky, hoc loco): Eichw. 1831, l. c.: 13, tab. 11.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Ширв., Караб.; **ЮЗ**: Занг.; **Т**.

Указан для **ВК**: В. Сулак. (Галушко, 1980: 260).

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

38 (43). **Cuminum** L.

1 (133). **C. cyminum** L. 1753, Sp. Pl.: 254.

Описан по материалам из Египта и Эфиопии.

Указан для **ВЗ**: Ширв.; **ЮЗ** (как дичающий) (Тамамшян, 1967: 73).

Средиз.; Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср., Южн. Азия; Сев. и троп. Африка; Сев., Центр. Америка. Широко культивируется и дичает.

39 (44). **Apium** L.

1 (134). **A. graveolens** L. 1753, Sp. Pl.: 264.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: Тер.-Сулак.; **ЗК**: Бело-Лаб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т**.

Указан для сорных мест всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 260).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Азия; Африка; Сев., Центр. Америка. Культивируется и дичает. Родина, по-видимому, Средиземноморье.

2 (135). **A. leptophyllum** (Pers.) F. Muell. ex Benth. 1866, Fl. Austr. 3: 371. — *Pimpinella leptophylla* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 324. — *Apium ammi* (Jacq.) Urb. aggr.: H. Wolff, 1927, in Engl. Pflanzenr. 90: 53. — *Helosciadium leptophylla* (Pers.) DC. 1828, Mém. Soc. Phys. Genève, 4, 1: 493.

Описан с о. Гаити («Ins. St. Dominica»).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. Заносное, натурализовавшееся.

Космополит.