

#### 40 (45). *Sison* L.

1 (136). *S. amomum* L. 1753, Sp. Pl.: 252.

Описан из Англии.

**ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.

Атл., Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

#### 41 (46). *Cicuta* L.

1 (137). *C. virosa* L. 1753, Sp. Pl.: 255.

Описан из Европы.

**ЗЗ:** Абх.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб. (Тамамшян, 1967: 73).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср., Центр., Вост., Южн. (Кашмир) Азия.

#### 42 (47). *Cryptotaenia* DC.

1 (138). *C. flahaultii* (Woronow) Koso-Pol. 1916, Вестн. Тифл. бот. сада, 38–39: 139. — *Lereschia flahaultii* Woronow, 1903, Тр. Бот. сада Юрьев. унив. 4, 2: 157. — *Deringa flahaultii* (Woronow) Koso-Pol. 1915, Bull. Soc. Nat. Moscou, n. s. 29: 136.

Описан из Абхазии. *L e s t o t y p u s* (Menitsky, hoc loco; Khan, 1980, in sched. herb. LE): «*Angustiae Petzkir, ad rupes calcareis humidis faucium lateralium prope p. Jurjewskoje, 26 VII – 08 VIII 1902, G. Woronow*» (LE!).

**ЗЗ:** Абх.

Эндемик.

#### 43 (48). *Ammi* L.

1 (139). *A. visnaga* (L.) Lam. 1779, Fl. Fr. 3: 462. — *Daucus visnaga* L. 1753, Sp. Pl.: 242. — *Visnaga daucoides* Gaertn. 1778, Fruct. Sem. Pl. 1: 192, tab. 21, fig. 12.

Описан из Южной Европы.

**ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Кубин.; **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур., Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум.; **ВК:** Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 261); **ЦЗ:** Лори (Спитакский р-н) (Гамбарян, 1999: 55); **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Ахундов, 1955: 442).

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Палестина, Ирак, сев. Иран, Пакистан), Южн. Азия; заносное в Сев. и Южн. Америке.

#### 44 (49). *Falcaria* Fabr.

1 (140). *F. vulgaris* Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 176. — *Sium falcaria* L. 1753, Sp. Pl.: 252. — *Drepanophyllum sioides* Wibel, 1799, Prim. Fl. Werth.: 196, nom. illeg. — *Falcaria rivinii* Host, 1827, Fl. Austr. 1: 381. — *F. sioides* (Wibel) Asch. 1864, Fl. Brandenb.: 241. — *F. persica* Stapf et Wettst. 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. (Wien), 51: 316.

Описан из Европы.

**ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т:** Указан для **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990: 155).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; заносное в Сев. и Южн. Америке.

2 (141). **F. falcarioides** (Bornm. et H. Wolff) H. Wolff, 1927, in Engl. Pflanzenr. 90: 132. — *Pimpinella falcarioides* Bornm. et H. Wolff, 1910, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 60: 177. — *Gongylosciadium falcarioides* (Bornm. et H. Wolff) Rech. f. 1987, Fl. Iran. 162: 308.

Описан из западного Ирана. *Syn typi*: «Urumia, in salsis inter Sahatli et Guschtschi, 20 VII 1884; distr. Afschar, ad aquas minerales pr. Achmedabad, 19 VIII 1884, Bornmüller» (WU).

**ЮЗ:** Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (южн. и центр. Турция, сев.-зап. и зап. Иран).

#### 45 (50). **Carum** L.

1 (142). **C. carvi** L. 1753, Sp. Pl.: 263. — *Bunium carvi* (L.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 211. — *Carum roselli* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 218. — ? *C. komarovii* Karjagin, 1944, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 10: 48.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Колмаков, 1928: 155; Танфильев, Кононов, 1987: 76); для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 261); **ЗЗ:** Абх. (Тамамшян, 1967: 76).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, сев. Иран, Афганистан, Пакистан) Азия; культивируется и дичает в Ср., Центр., Вост., Южн. Азии; заносное в Сев. Америке и Новой Зеландии.

2 (143). **C. porphyrocoleon** (Freyn et Sint.) Woronow, 1931, Sched. Herb. Fl. Cauc. 21: № 523. — *C. leucocoleon* Boiss. et A. Huet var. *porphyrocoleon* Freyn et Sint. 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 304. — *C. leucocoleon* auct. non Boiss. et A. Huet: Hedge a. Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 348.

Описан из северной Турции. *Typus*: «Armenia turcica, Szandschak Gumuschkhane, Karagoeldagh, in pascuis alpin. «Tschadirla», 22 VII 1894, № 7274, P. Sintenis» (B; isotypus — E, LE, P).

**ЗК:** Уруп-Тeb.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (144). **C. caucasicum** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 880. — *Laserpitium caucasicum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 222. — *Cnidium carvifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 212.

Описан с Центрального Кавказа. *Typus*: «Kaischaur, 1805, Bieberst.» (LE!).

**ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.