

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т:** Указан для **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990: 155).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия; заносное в Сев. и Южн. Америке.

2 (141). **F. falcarioides** (Bornm. et H. Wolff) H. Wolff, 1927, in Engl. Pflanzenr. 90: 132. — *Pimpinella falcarioides* Bornm. et H. Wolff, 1910, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 60: 177. — *Gongylosciadium falcarioides* (Bornm. et H. Wolff) Rech. f. 1987, Fl. Iran. 162: 308.

Описан из западного Ирана. *Syn ty pi*: «Urumia, in salsis inter Sahatli et Guschtschi, 20 VII 1884; distr. Afschar, ad aquas minerales pr. Achmedabad, 19 VIII 1884, Bornmüller» (WU).

ЮЗ: Ерев., Севан.

Юго-Зап. Азия (южн. и центр. Турция, сев.-зап. и зап. Иран).

45 (50). **Carum** L.

1 (142). **C. carvi** L. 1753, Sp. Pl.: 263. — *Bunium carvi* (L.) Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 211. — *Carum roselli* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 218. — ? *C. komarovii* Karjagin, 1944, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 10: 48.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион, Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Колмаков, 1928: 155; Танфильев, Кононов, 1987: 76); для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 261); **ЗЗ:** Абх. (Тамамшян, 1967: 76).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, сев. Иран, Афганистан, Пакистан) Азия; культивируется и дичает в Ср., Центр., Вост., Южн. Азии; заносное в Сев. Америке и Новой Зеландии.

2 (143). **C. porphyrocoleon** (Freyn et Sint.) Woronow, 1931, Sched. Herb. Fl. Cauc. 21: № 523. — *C. leucocoleon* Boiss. et A. Huet var. *porphyrocoleon* Freyn et Sint. 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 304. — *C. leucocoleon* auct. non Boiss. et A. Huet: Hedge a. Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 348.

Описан из северной Турции. *T y p u s*: «Armenia turcica, Szandschak Gumuschkhane, Karagoeldagh, in pascuis alpin. «Tschadirla», 22 VII 1894, № 7274, P. Sintenis» (B; isoty pi — E, LE, P).

ЗК: Уруп-Тeb.; **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ; ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Юго-Зап. Азия (Турция).

3 (144). **C. caucasicum** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 880. — *Laserpitium caucasicum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 222. — *Cnidium carvifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 212.

Описан с Центрального Кавказа. *T y p u s*: «Kaischaur, 1805, Bieberst.» (LE!).

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.

Указан для **ЮЗ**: Нах. (Ахундов, 1955: 445).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран, сев. Ирак).

4 (145). **C. meifolium** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 880. — *Cnidium meifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 213. — *Carum grossheimii* Schischk. 1948, Бот. журн. 33, 3: 315.

Описан с Кавказа («in Caucasi alpestribus»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Юго-Зап. Азия (сев. и вост. Турция).

5 (146). **C. alpinum** (Bieb.) Benth. et Hook. f. 1867, Gen. Pl. 1: 891. — *Seseli alpinum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 236. — *Lomatocarum alpinum* (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 1840, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 17. — *Carum lomatocarum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 879. — *C. colchicum* Lipsky, 1895, Тр. Петерб. бот. сада, 14: 272.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р u s: «Kaischaur, Bieberstein» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

46 (51). **Bunium** L.

1 (147). **B. elegans** (Fenzl) Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 13: 83. — *Carum elegans* Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. et Taur. Occ. 1: 16. — *C. noëanum* Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 2: 77. — *Bunium noëanum* (Boiss.) Woronow ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 158. — *Sympodium simplex* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 336. — *Bunium simplex* (C. Koch) Kljuikov, 1983, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 88, 4: 139. — *B. paucifolium* auct. non DC.: Hedge a. Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 343.

Описан из Сирии. Т у р u s: «Hab. in Syria circa Aleppo. Kotschy pl. alepp. № 265» (W; isotypi — G-BOISS, K).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Ирак, сев. и зап. Иран).

2 (148). **B. paucifolium** DC. 1830, Prodr. 4: 117. — *Carum elegans* Fenzl var. *junceum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 884. — *Bunium filipes* Freyn et Conrath, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 305.

Описан из Ирана. Т у р u s: «In convallibus herbidis montium Seidkhodzen-sium Persiae» (G-DC?).

ВК: Кубин.; **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Агаджанов, 1955: 446).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).