

Указан для **ЮЗ**: Нах. (Ахундов, 1955: 445).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Иран, сев. Ирак).

4 (145). **C. meifolium** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 880. — *Cnidium meifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 213. — *Carum grossheimii* Schischk. 1948, Бот. журн. 33, 3: 315.

Описан с Кавказа («in Caucasi alpestribus»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Юго-Зап. Азия (сев. и вост. Турция).

5 (146). **C. alpinum** (Bieb.) Benth. et Hook. f. 1867, Gen. Pl. 1: 891. — *Seseli alpinum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 236. — *Lomatocarum alpinum* (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 1840, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 17. — *Carum lomatocarum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 879. — *C. colchicum* Lipsky, 1895, Тр. Петерб. бот. сада, 14: 272.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р u s: «Kaischaur, Bieberstein» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Эндемик.

46 (51). **Bunium** L.

1 (147). **B. elegans** (Fenzl) Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 13: 83. — *Carum elegans* Fenzl, 1842, Pugil. Pl. Nov. Syr. et Taur. Occ. 1: 16. — *C. noëanum* Boiss. 1856, Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 2: 77. — *Bunium noëanum* (Boiss.) Woronow ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 158. — *Sympodium simplex* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 336. — *Bunium simplex* (C. Koch) Kljuikov, 1983, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 88, 4: 139. — *B. paucifolium* auct. non DC.: Hedge a. Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 343.

Описан из Сирии. Т у р u s: «Hab. in Syria circa Aleppo. Kotschy pl. alepp. № 265» (W; isotypi — G-BOISS, K).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, Сирия, Ливан, Палестина, Ирак, сев. и зап. Иран).

2 (148). **B. paucifolium** DC. 1830, Prodr. 4: 117. — *Carum elegans* Fenzl var. *junceum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 884. — *Bunium filipes* Freyn et Conrath, 1895, Bull. Herb. Boiss. 3: 305.

Описан из Ирана. Т у р u s: «In convallibus herbidis montium Seidkhodzen-sium Persiae» (G-DC?).

ВК: Кубин.; **ВЗ**: Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Караб.; **ЮЗ**: Ю. Караб. (Агаджанов, 1955: 446).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (149). **B. bourgaei** (Boiss.) Freyn et Sint. 1894, Österr. Bot. Zeitschr. 44: 99. — *Carum bourgaei* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 885. — *Bunium microcarpum* (Boiss.) Freyn et Sint. subsp. *bourgaei* (Boiss.) Hedge et Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 345. — *B. ferulaceum* auct. non Sm.: Гросср. 1932, Фл. Кавк. 3: 159; Тамамш. 1967, в Гросср. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 80.

Описан по материалам из северной Турции. S y n t y p i: «Prope Gümüşkane, Bourgeau; in collibus Ponti Lazici Djimil, C. Koch, Balansa» (G-BOISS).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

4 (150). **B. scabrellum** Korovin, 1950, Фл. СССР, 16: 597; Коровин, 1949, в Гросср. Опред. раст. Кавк.: 227, nom. nud.

Описан из Тальша. T y p u s: «In pratis subalpinis versus pag. Drych, Suvant, 18 VI 1830, C. Meyer» (LE!).

Т.

Эндемик?

5 (151). **B. cylindricum** (Boiss. et Hohen.) Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 42, 3: 83 («*cylindraceutum*»); Drude, 1898, in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3, 8: 194. — *Carum cylindricum* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 23.

Описан из Ирана. T y p u s: «In m. Elburs prope Derbent, № 118, Kotschy» (G-BOISS; isotypi — E, LE?, P, W).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

47 (52). **Elaeosticta** Fenzl

1 (152). **E. glaucescens** (DC.) Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 51. — *Bunium glaucescens* DC. 1830, Prodr. 4: 117. — *Scaligeria glaucescens* (DC.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 877.

Описан из Ирана. T y p u s: «In convallibus herbicis ad Seidkhodzi Persiae, Szovits» (G-BOISS).

ЦЗ: Лори; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Мерг.-Зан.

Указан для **ЮЗ:** Нах. (Ахундов, 1955: 406).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

2 (153). **E. lutea** (Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov, Pimenov et V. N. Tikhom. 1978, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 83, 6: 105. — *Bunium luteum* Bieb. ex Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 108; Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 207. — *Muretia lutea* (Bieb. ex Hoffm.) Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 1: 143. — *M. tanaicensis* Boiss. 1844, l. c.: 143.

Описан с нижней Волги («habitat locis desertis, ad coloniam Sareptanam, Herrmann?»).

ЗП: Аз.-Куб.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Ср. (сев.-зап. Казахстан) Азия.