

3 (149). **B. bourgaei** (Boiss.) Freyn et Sint. 1894, Österr. Bot. Zeitschr. 44: 99. — *Carum bourgaei* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 885. — *Bunium microcarpum* (Boiss.) Freyn et Sint. subsp. *bourgaei* (Boiss.) Hedge et Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 345. — *B. ferulaceum* auct. non Sm.: Гросср. 1932, Фл. Кавк. 3: 159; Тамамш. 1967, в Гросср. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 80.

Описан по материалам из северной Турции. *Syn typi*: «Prope Gümüşkane, Bourgeau; in collibus Ponti Lazici Djimil, C. Koch, Balansa» (G-BOISS).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тиб.; **ЦК**: В. Тер.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЗЗ**: Абх.; **ВЗ**: Ширв., Караб.; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

4 (150). **B. scabrellum** Korovin, 1950, Фл. СССР, 16: 597; Коровин, 1949, в Гросср. Опред. раст. Кавк.: 227, nom. nud.

Описан из Талыша. *Т у р u s*: «In pratis subalpinis versus pag. Drych, Suvant, 18 VI 1830, C. Meyer» (LE!).

Т.

Эндемик?

5 (151). **B. cylindricum** (Boiss. et Hohen.) Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 42, 3: 83 («*cylindraceutum*»); Drude, 1898, in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3, 8: 194. — *Carum cylindricum* Boiss. et Hohen. 1849, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 23.

Описан из Ирана. *Т у р u s*: «In m. Elburs prope Derbent, № 118, Kotschy» (G-BOISS; isotypi — E, LE?, P, W).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

47 (52). **Elaeosticta** Fenzl

1 (152). **E. glaucescens** (DC.) Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 51. — *Bunium glaucescens* DC. 1830, Prodr. 4: 117. — *Scaligeria glaucescens* (DC.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 877.

Описан из Ирана. *Т у р u s*: «In convallibus herbidis ad Seidkhodzi Persiae, Szovits» (G-BOISS).

ЦЗ: Лори; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Мерг.-Зан.

Указан для **ЮЗ**: Нах. (Ахундов, 1955: 406).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

2 (153). **E. lutea** (Bieb. ex Hoffm.) Kljuykov, Pimenov et V. N. Tikhom. 1978, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 83, 6: 105. — *Bunium luteum* Bieb. ex Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 108; Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 207. — *Muretia lutea* (Bieb. ex Hoffm.) Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 1: 143. — *M. tanaicensis* Boiss. 1844, l. c.: 143.

Описан с нижней Волги («habitat locis desertis, ad coloniam Sareptanam, Herrmann?»).

ЗП: Аз.-Куб.

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев. (Зап. Сибирь), Ср. (сев.-зап. Казахстан) Азия.