

Указан для всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 263).
Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев.-зап. Иран).

50 (55). *Aegopodium* L.

1 (166). *A. podagraria* L. 1753, Sp. Pl.: 265.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ЗЗ: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 263; Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср. Азия; заносное в Сев. Америке.

51 (56). *Sium* L.

1 (167). *S. sisarum* L. 1753, Sp. Pl.: 251. — *S. lancifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 230, non Schrank, 1789. — *S. sisaroides* DC. 1830, Prodr. 4: 124.

Происхождение неизвестно.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах.; **Т:**

Указан (sub. *S. sisaroides* DC.) для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 263).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Ирак, Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

2 (168). *S. latifolium* L. 1753, Sp. Pl.: 254. — *S. lancifolium* Schrank, 1789, Baier. Fl. 1: 556, non Bieb. 1819.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ВК:** Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.

Указан для **ЦК:** В. Кум. (Вернандер, 1946: 195; Танфильев, Кононов, 1987: 76).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Ср. Азия.

3 (169). *S. erectum* Huds. 1762, Fl. Angl.: 103. — *S. angustifolium* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1672. — *Berula angustifolia* (L.) Mert. et W. D. J. Koch, 1826, in Röhl. Deutschl. Fl. 2: 433. — *B. erecta* (Huds.) Coville, 1893, Contr. U. S. Nat. Herb. 4: 115. — *B. orientalis* Woronow, 1931, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 5: 796, nom. nud.; Шишк. 1950, Фл. СССР, 16: 467. — *Sium orientale* (Woronow) Soó, 1965, Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 11, 1-2: 244. — *Siella erecta* (Huds.) Pimenov, 1978, Бот. журн. 63, 12: 1746.

Описан из Англии.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК**; **ВК**: Ассо-Арг.; **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 264; Танфильев, Кононов, 1987: 76); **ВЗ**: Алаз.-Агр. Ширв., Н. Кур. (Ахундов, 1955: 463).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Южн. Азия; заносное в Сев., Центр. Америке и Австралии.

52 (57). *Crithmum* L.

1 (170). *C. maritimum* L. 1753, Sp. Pl.: 246.

Описан из Европы.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Adj.

Атл., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Палестина, Ирак).

53 (58). *Seseli* L.

1 (171). *S. alexeenkoi* Lipsky, 1902, Тр. Тифл. бот. сада, 5, 1: 55.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Menitsky, nos loco): «Дагестан, Даргин[ский] округ, близ Ходжал-Махи, на известняках, 3100', 12 VIII 1898, Алексеевко» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

2 (172). *S. leptocladum* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 219. — *S. sedae* Takht. 1940, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 9: 24.

Описан из Армении. *Typus*: «Армения, Даралагез, известняки левого склона ущелья р. Арпачая, против устья Койтур-су, 1500 м, 27 VII 1928, И. и А. Щукины» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах.

Эндемик.

3 (173). *S. dichotomum* Pall. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 235.

Описан из Крыма («in Tauriae collibus calcareis»). *Lectotypus* (Menitsky, nos loco): «Ex Tauria. Herb. Bieb.» (LE!).

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Гроссгейм, 1932: 165; Тамамшян, 1967: 90).

Юго-Вост. Европа (Крым).

4 (174). *S. rupicola* Woronow, 1905, Тр. Петерб. общ. естествоисп. 34: 26.

Описан из Абхазии. *Typus*: «Ad ripas calcareis apricis Abkhasiae in angustiis Petzkir, August 1894, G. Woronow» (LE!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.

Эндемик.

5 (175). *S. cuneifolium* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 113.

Описан с Восточного Кавказа. *Typus*: «Passim in abruptis montium altiorum circa Kurt-Bulak. Herb. M. Bieberstein» (LE!).