

Указан для **ЗП**: З. Ставр.; **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЗК**; **ВК**: Ассо-Арг.; **СЗЗ**: Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 264; Танфильев, Кононов, 1987: 76); **ВЗ**: Алаз.-Агр. Ширв., Н. Кур. (Ахундов, 1955: 463).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр., Южн. Азия; заносное в Сев., Центр. Америке и Австралии.

52 (57). *Crithmum* L.

1 (170). *C. maritimum* L. 1753, Sp. Pl.: 246.

Описан из Европы.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Adj.

Атл., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Палестина, Ирак).

53 (58). *Seseli* L.

1 (171). *S. alexeenkoi* Lipsky, 1902, Тр. Тифл. бот. сада, 5, 1: 55.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Menitsky, nos loco): «Дагестан, Даргин[ский] округ, близ Ходжал-Махи, на известняках, 3100', 12 VIII 1898, Алексеевко» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

2 (172). *S. leptocladum* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 219. — *S. sedae* Takht. 1940, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 9: 24.

Описан из Армении. *Typus*: «Армения, Даралагез, известняки левого склона ущелья р. Арпачая, против устья Койтур-су, 1500 м, 27 VII 1928, И. и А. Щукины» (LE!).

ЮЗ: Дар., Нах.

Эндемик.

3 (173). *S. dichotomum* Pall. ex Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 235.

Описан из Крыма («in Tauriae collibus calcareis»). *Lectotypus* (Menitsky, nos loco): «Ex Tauria. Herb. Bieb.» (LE!).

Указан для **ЦК**: В. Кум. (Гроссгейм, 1932: 165; Тамамшян, 1967: 90).

Юго-Вост. Европа (Крым).

4 (174). *S. rupicola* Woronow, 1905, Тр. Петерб. общ. естествоисп. 34: 26.

Описан из Абхазии. *Typus*: «Ad ripas calcareis apricis Abkhasiae in angustiis Petzkir, August 1894, G. Woronow» (LE!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Абх.

Эндемик.

5 (175). *S. cuneifolium* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 113.

Описан с Восточного Кавказа. *Typus*: «Passim in abruptis montium altiorum circa Kurt-Bulak. Herb. M. Bieberstein» (LE!).