

55 (60). *Aethusa* L.

1 (190). *A. cynapium* L. 1753, Sp. Pl.: 256.

Описан из Европы.

ЗП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 265);

ВЗ: Ширв. (Ахундов, 1955: 471).

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция); заносное в Сев. Америке.

56 (61). *Foeniculum* Mill.

1 (191). *F. vulgare* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 1. — *Anethum foeniculum* L. 1753, Sp. Pl.: 263. — *Foeniculum officinale* All. 1785, Fl. Pedem. 2: 25.

Описан из Южной Европы.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ВЗ:** Караб. (Тамамшян, 1967: 97; Дмитриева, 1990: 160); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Ахундов, 1955: 472).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия; заносное в Вост. и Южн. Азии, Африке, Сев., Южн. Америке и Австралии.

57 (62). *Silaum* Mill.

1 (192). *S. alpestre* (L.) Thell. 1926, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 2: 1295. — *Peucedanum alpestre* L. 1753, Sp. Pl.: 246. — *Silaus besseri* DC. 1830, Prodr. 4: 161. — *S. alpestris* (L.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 974. — *Silaum besseri* (DC.) Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 170. — *Peucedanum silaus* auct. non L.: Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 215.

Описан, по-видимому, из Европы.

ЗК: Уруп-Теб.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. (Тамамшян, 1967: 98; Танфильев, Кононов, 1987: 77).

Центр., Вост. Европа; Сев., Ср. (Казахстан) Азия.

58 (63). *Cnidium* Cusson

1 (193). *C. pauciradiatum* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 76. — *C. affine* C. A. Mey. 1849, Mat. познан. прозяб. Росс. имп. 6: 152; Шишк. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 409 (non vidi). — *Carum saxicolom* Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 103, syn. nov. — *Ligusticum pauciradiatum* (Sommier et Levier) Koso-Pol. 1915, Bull. Soc. Nat. Moscou, n. s. 29: 210. — *Selinum pauciradiatum* (Sommier et Levier.) Leute, 1970, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 74: 509. — *Seseli saxicolom* (Albov) Pimenov, 1979, Новости сист. высш. раст. 1978, 15: 200. — *Cnidium mandenovae* Gagnidze, 1981, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 37: 26.

Описан из Абхазии. Т у р у s: «In jugo Kluchor merid. Abchasiae, 2300 m, 27 VIII, Sommier et Levier» (FI).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Тамамшян, 1967: 98), Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 266; Танфильев, Кононов, 1987: 77); **ЦК:** В. Тер. (Meyer, 1849: 152); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Шишкин, 1950: 559).

Эндемик.

2 (194). **C. grossheimii** Manden. 1950, Бот. мат. (Ленинград), 13: 171. — *C. pauciradiatum* Sommier et Levier var. *grossheimii* (Manden.) Tamamsch. 1967, в Гросср. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 98, sine indic. basion. — *Cnidiocarpa grossheimii* (Manden.) Pimenov, 1983, Бот. журн. 68, 1: 88.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «ГССР, окр. Бакуриани, Имеретинский отрог, субальпийский луг, 1 VIII 1940, И. Манденова» (ТВИ; isotypus — LE!).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Эндемик.

Вид производит впечатление межвидового гибрида *Ligusticum alatum* × *L. physospermifolium*, но имеет 1 каналец в ложбинках.

59 (64). *Ligusticum* L.

1 (195). **L. arafae** Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 250. — *Arafoe aromatica* Pimenov et Lavrova, 1989, Бот. журн. 74, 1: 102.

Описан из Абхазии. S y n t y p i: «Mt. Oshten, paturages alpius, 13 IX 1893, № 306; гора Кутерику, абхазский склон, альпийский луг, 7 VIII 1893, № 116, N. Alboff» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Эндемик.

2 (196). **L. alatum** (Bieb.) Spreng. 1813, Pl. Umb. Prodr.: 40. — *Athamanta alata* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 214. — *Cnidium myrrhifolium* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 212. — *Macroscadium alatum* (Bieb.) V. N. Tikhom. et Lavrova, 1988, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 93, 6: 63.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р у s: «Circa Narzana, 1799 et 1803, Bieberstein» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.

Указан для всех лесных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 266); **ВЗ:** Ширв., Караб. (Ахундов, 1955: 473); **ЮЗ:** Севан. (Тамамшян, 1967, карта 110). Юго-Зап. Азия (сев.-вост., вост. и южн. Турция).

3 (197). **L. physospermifolium** Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 109. — *Macroscadium physospermifolium* (Albov) V. N. Tikhom. et Lavrova, 1988, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 93, 6: 64.

Описан из Западного Закавказья. L e c t o t y p u s (Leute, 1970: 489): «Abchasia, m. Mamdyshkha, 1900 m, № 174, N. Albov» (E!; isolectotypi — LE!, ТВИ!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Эндемик.