

pratense Hoffm. 1816, Gen. Pl. Umb. ed. 2: 164. — *O. palustre* (Bess.) Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 94.

Описан из «Галиции».

Указан для **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 268), Бело-Лаб. (Виноградова, 1977: 532); **ЦК**: Малк. (Османова и др., 1969: 272–273; Османова, 1972: 245), В. Тер. (Пименов, 1982: 37).

Центр., Вост., Юго-Вост. Европа; Сев., Ср. (Казахстан) Азия.

61 (66). *Agasyllis* Spreng.

1 (207). **A. latifolia** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 980. — *Cachrys latifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 219. — *Agasyllis caucasica* Spreng. 1813, Neue Schriften Naturf. Ges. Halle, 2, 1: 22. — *Chymysdia agasyллоides* Albov var. *colchica* Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 110. — *C. colchica* (Albov) Woronow 1932, в Гроссг. Фл. Кавк. 3: 174.

Описан с Центрального Кавказа. Т у р u s: «*Circa acidulam* Narzana, Herb. Bieberstein» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Севан, Занг.

Указан для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 268); **ЗЗ**: Рион.-Квир., Адж. (Тамамшян, 1967: 103; Дмитриева, 1990: 161); **ВЗ**: Алаз.-Агрич. (Карягин, 1955: 474).

Эндемик.

62 (67). *Chymysdia* Albov

1 (208). **C. agasyллоides** (Albov) Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 110. — *Selinum agasyллоides* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 252.

Описан из Абхазии. Т у р u s: «*In pratis alpinis montium calcarearum Abchasiae (ad montem Czipshiram), alt. 7000–7500', N. Alboff*» (?).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

63 (68). *Johrenia* DC.

1 (209). **J. paucijuga** (DC.) Bornm. 1910, Русск. бот. журн. 1–2: 9. — *Ferula paucijuga* DC. 1830, Prodr. 4: 171. — *Johrenia candollei* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 1: 306. — *J. persica* Boiss. 1844, l. c.: 306.

Описан из северного Ирана. Т у р u s: «*In Persia ad radices montium circa Badalan, Szowits*» (G-DC?).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Мерг.-Зан.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

64 (69). *Eriosynaphe* DC.

1 (210). **E. longifolia** (Fisch. ex Spreng.) DC. 1829, Coll. Mém. 5: 51. — *Ferula longifolia* Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 45, nom. nud.; Spreng. 1818, Sp. Umb.: 86.

Описан из Восточной Европы.

ЦК: В. Кум.

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Тамамшян, 1967: 107; Танфильев, Кононов, 1987: 77); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 269; Танфильев, Кононов, 1987: 77), Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 269).

Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

65 (70). **Ferula** L.

1 (211). **F. oopoda** (Boiss. et Buhse) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 984. — *Peucedanum oopodum* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 100.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Beim Salzbergwerk in der Nahe von Nachitschewan, in einer Schlucht, 11 V 1847, № 295, Buhse» (G).

ЮЗ: Нах.

Юго-Зап. (сев. Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. (Копетдаг) Азия.

2 (212). **F. rigidula** DC. 1830, Prodr. 4: 172. — *F. laeta* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 219.

Описан из Ирана. Т у р у s: «In Persiae saxosis montium Seidkhodzenseium, Szowits» (G-DC; isotypus — LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Нах., Занг.; Т.

Указан для **ВЗ:** Караб. (Карягин, 1955: 481).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

3 (213). **F. calcarea** Pimenov, 1980, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 117: 29.

Описан из Дагестана. Т у р у s: «Окрестности Махачкалы, с. Талги» (MW).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.

Эндемик.

4 (214). **F. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 247. — *Peucedanum orientale* (L.) Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 4: 309.

Описан с «Востока».

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Тамамшян, 1967: 109).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, сев. Иран).

5 (215). **F. tatarica** Fisch. ex Spreng. 1813, Pl. Min. Cogn. Pug. 1: 27, excl. syn. — *F. longifolia* Spreng. 1818, Sp. Umb.: 86.

Описан, по-видимому, из Юго-Восточной Европы.

ЗП; ВК: Ассо-Арг., Ман.-Самур.

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1980: 269; Танфильев, Кононов, 1987: 77); **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 269).

Юго-Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

6 (216). **F. caspica** Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 220. — *F. caucasica* Korovin, 1947, Илл. моногр. *Ferula*: 78.

Описан с Прикаспийской низменности («in deserto caucasico-caspico, ad viam publicam inter Astrachan et Kisljar, quadraginta a posteriori oppido leucas