

rossicas»). *Lectotypus* (Menitsky, hoc loco): «Ex planitiebus oppido Kisljar vicinis, Bieberstein» (LE!).

ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв., Мург.-Муровд.
Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВК:** В. Сулак, Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 269).
Юго-Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср. Азия.

7 (217). **F. persica** Willd. 1798, Sp. Pl. 1, 2: 1418.

Описан из Ирана («Habitat in Persia»).

ВЗ: Ширв.; **ЮЗ:** Ерев.
Указан для **ЮЗ:** Нах. (Карягин, 1955: 480).
Юго-Зап. Азия (Иран).

8 (218). **F. szowitsiana** DC. 1830, Prodr. 4: 174. — *F. microloba* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 989.

Описан из северного Ирана. *Т у р u s*: «In argillosis lapidosisque Persiae ad pagum Seidkhodzi, Szowits» (LE!; isotypus — K).

ЮЗ: Ерев., Нах.
Юго-Зап. (Турция, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

9 (219). **F. euxina** Pimenov, 1980, Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 117: 27.

Описан из Южной Украины (Херсонская обл.). *Т у р u s*: «Заповедник Аскания-Нова, степь Успенская, 26 VI 1928, Рыбакова» (MW!).

ЗП: Аз.-Куб. (только около Ейска).
? Вост. Европа.

66 (71). **Ferulago** W. D. J. Koch

1 (220). **F. campestris** (Bess.) Grecescu, 1898, Consp. Fl. Roman.: 252. — *Ferula campestris* Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 44. — *Ferulago daghestanica* Schischk. 1946, Бот. журн. СССР, 31, 6: 8. — *Ferula nodiflora* auct. non L.: Bieb. 1808, Fl. Taur.-Sauc.: 220. — *Ferulago galbanifera* auct. non (Mill.) W. D. J. Koch: Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 997, p. p.; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 179; Peşmen, 1972, Fl. Turk. 4: 455.

Описан с «Волыни».

ЗП; ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Указан для всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 269); **ЗК:** Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 77); **ВЗ:** Ширв. (Карягин, 1955: 484).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап Азия (сев. Турция).

2 (221). **F. setifolia** C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 358. — *F. pauciflora* C. Koch, 1842, l. c.: 358. — *F. oxyptera* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 1: 320. — *Lophosciadium setifolium* (C. Koch) C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 39.

Описан из Южного Закавказья («in Armenia boreali»). *Л е c t o т у р u s* (Томкович, Пименов, 1981: 66): «In Armenia ruthenica versus Daratschitschak, 1837, № 1055, C. Koch» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.
Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб. (Карягин, 1955: 484).
Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).