

74 (79). *Symphyoloma* C. A. Mey.

1 (250). *S. graveolens* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 127.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у с: «Inter fragmina schisti in alpe Tufandagh, 31 VII 1830, C. A. Meyer» (LE!).

ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агртч.

Указан для **ВЗ:** Ширв. (Карягин, 1955: 495).

Эндемик.

75 (80). *Heracleum* L.

1 (251). *H. sibiricum* L. 1753, Sp. Pl.: 249.

Описан из Сибири.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 78); **ЦК:** Малк. (Османова, 1972: 245).

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев. Азия.

2 (252). *H. asperum* (Hoffm.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 224. — *Sphondylium asperum* Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 134. — *Heracleum umbonatum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 1043.

Описан по культивировавшимся в Горенковском саду экземплярам, выращенным из семян, происходивших, по-видимому, с Кавказа.

ЗК; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агртч.

Эндемик.

3 (253). *H. ponticum* (Lipsky) Schischk. ex Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 185. — *H. cyclocarpum* C. Koch var. *ponticum* Lipsky, 1895, Тр. Петерб. бот. сада, 14: 275. — *H. sphondylium* L. var. *caucasicum* Sommier et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада, 16: 192. — *H. mandenovae* Satzур. 1977, Бот. журн. 62, 8: 1166.

Описан из Западного Закавказья. Т у р у с: «По р. Пслух (приток Мзымты) в Черном[орском] округе, 3 VIII 1895, В. Липский» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион.-Квир.

Эндемик.

4 (254). *H. cyclocarpum* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 361. — *H. palmatifidum* Fisch. et Avé-Lall. 1843, Index Sem. Hort. Bot. Péteropol. 9: 73. — *H. sphondylium* L. subsp. *cyclocarpum* (C. Koch) P. H. Davis, 1972, Fl. Turk. 4: 491. — *H. pollinianum* auct. non Bertol.: Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 186; Тамаш. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 127.

Описан из Центрального Закавказья («in Carthalia, Imerethia boreali nec non in Ossia»).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

5 (255). *H. aconitifolium* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 220.

Описан из Абхазии. Т у р у с: «In Abkhaziae Bzybicae pascuis subalpinis inter montes Tshkha (Antshkha) et Lakorzi-tau, 15 VIII 1929, W. Demjanov» (LE).