

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.

Указан для **ВК:** Кубин. (Карягин, 1955: 505); **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 272); **ЮЗ:** Нах. (Карягин, 1955: 505).

Эндемик.

2 (278). **M. dasyantha** (C. Koch) Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 242. — *Pastinaca dasyantha* C. Koch, 1842, Linnaea, 16: 359. — *Malabaila pimpinellifolia* (Bieb.) Boiss. var. *dasyantha* (C. Koch) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 1056.

Описан из Армении («in Armenia inter segetes et montes»).

ЦЗ: Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ.**

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Карягин, 1955: 505).

Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (279). **M. graveolens** (Spreng.) Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb. 1: 126. — *Heracleum graveolens* (Bieb.) Spreng. 1813, Pl. Umb. Prodr.: 12. — *Pastinaca graveolens* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 237, non Bernh. 1800.

Описан по материалам с Кавказа и из Крыма («in arvis et inter segetes imprimis Tauriae»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.

Указан для **ЗП:** З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум. (Тамамшян, 1967: 132; Галушко, 1980: 272; Танфильев, Кононов, 1987: 78); **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 272).

Юго-Вост., Вост. Европа; Ср. Азия.

78 (83). **Zosima** Hoffm.

1 (280). **Z. absinthifolia** (Vent.) Link, 1821, Enum. Pl. Horti Berol. Alt. 1: 274. — *Heracleum absinthifolium* Vent. 1803, Choix Pl.: 7. — *Zosima orientalis* Hoffm. 1814, Gen. Pl. Umb.: 148, nom. illeg. superfl.

Описан по культивировавшимся во Франции (Jardin de Cels) экземплярам, выращенным из семян, собранных на пути из Багдада в Керменшах. *Lectoturus* (Menitsky, hoc loco): Vent. 1803, l. c.: 7, icon.

ЗК: Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЦК:** **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Указан для Предкавказья (Манденова, 1953: 153); **ВЗ:** Н. Кур., Караб. (Карягин, 1955: 506).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Аравия, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. (Туркмения) Азия.

79 (84). **Tordylium** L.

1 (281). **T. maximum** L. 1753, Sp. Pl.: 239.

Описан из Италии.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Тамамшян, 1967: 134); всех районов Предкавказья (Галушко, 1980: 276); **ЗК**: Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 78); **ЗЗ**: Адж. (Тамамшян, 1967: 134; Дмитриева, 1990: 165).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (сев. и центр. Турция, сев. Иран).

2 (282). **T. komarovii** Manden. 1940, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 9: 41. — *Trigonosciadium komarovii* (Manden.) Tamamsch. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 134. — *Mandenovia komarovii* (Manden.) Alava, 1973, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 32, 2: 191.

Описан с Восточного Кавказа. Л е с т о т у р у с (Тамамшян, 1967: 134): «Дагестанская АССР, Андийский округ, Данух, 7 VIII 1915, А. Гроссгейм» (ТВИ!).

ЦК: В. Тер.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак.

Эндемик.

Trib. 9. *Laserpitieae* Drude

80 (85). *Polylophium* Boiss.

1 (283). **P. panjutinii** Manden. et Schischk. 1948, Бот. журн. 33, 3: 318.

Описан из «Мингрелии». Т у р у с: «Гора Мигария, крутой южный склон на выс. 1800 м, субальпийский луг, 12 VIII 1937, П. Панютин» (LE!).

ЗЗ: Инг.-Рион.

Эндемик.

81 (86). *Laserpitium* L.

1 (284). **L. hispidum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 221.

Описан по материалам из Крыма и с Кавказа («in Tauriae Caucasiqae glaeosis, nec non ad margines sylvarum»).

ЗК; **ЦК**; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.

Указан для **ВП**: В. Ставро. (Галушко, 1980: 276).

Вост., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев. и центр. Турция).

2 (285). **L. stevenii** Fisch. et Trautv. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 40. — *L. dauciforme* Schmalh. ex Akinf. 1892, Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. общ.: 207. — *L. platysperum* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 83.

Описан, по-видимому, с Кавказа («Patria ignota. Semina a Stevenio communicata»).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.

Эндемик.

3 (286). **L. affine** Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 335. — *L. leucolaenum* Boiss. et Bal. 1872, in Boiss. Fl. Or. 2: 1065.

Описан из Западного Закавказья. Т у р у с: «Guria, Nordmann» (LE!).

ЗЗ: Рион.-Квир., Адж.; **ЮЗЗ**: Месх.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).