

Описан из Турции. *Lectotypus* (Pimenov, Tamamschian, 1987: 47): «Турецкая Армения, Баязетский санджак, степные склоны, 1 VII 1916, Б. Шишкин» (LE!).

ЮЗ: Ерев., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев.-зап. Иран).

Subfam. 3. APIOIDEAE (Drude) Thorne ex P. Royen

Trib. 1. **Echinophoreae** Benth. et Hook. f.

7 (12). **Echinophora** L.

1 (27). **E. orientalis** Hedge et Lamond, 1971, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 31: 78. — *E. trichophylla* auct. non Sm.: Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 948; Гросср. 1932, Фл. Кавк. 3: 123; Шишк. 1950, Фл. СССР, 16: 89; Карягин, 1955, Фл. Азерб. 6: 371; Тамамш. 1967, в Гросср. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 22.

Описан из восточной Турции. *Typus*: «Agri Dagh, № 564b, Szovits» (G-DC).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мерг.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

2 (28). **E. sibthorpiana** Guss. 1832, Fl. Sic. Prodr. Suppl.: 69. — *Chrysosciadium sibthorpiantum* (Guss.) Tamamsch. 1967, в Гросср. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 24, comb. inval. — *Echinophora tenuifolia* L. subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin, 1967, Feddes Repert. 74: 31.

Описан из Сицилии.

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мерг.-Зан.

Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция, сев. Иран, Афганистан), Ср. Азия.

Trib. 2. **Scandiceae** DC.

8 (13). **Physocaulis** (DC.) Tausch

1 (29). **P. nodosus** (L.) W. D. J. Koch, 1843, Syn. Fl. Germ. ed. 2: 348. — *Scandix nodosa* L. 1753, Sp. Pl.: 257. — *Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz, 1767, Class. Umb.: 76. — *Anthriscus nodosa* (L.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 320. — *Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon, 1968, Feddes Repert. 79: 65, nom. illeg.

Описан из Сицилии.

ВК: Ман.-Самур; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мерг.-Зан.

Указан для **ЗП** (Колмаков, 1928: 154; Шишкин, 1950: 94; Тамамшян, 1967: 26; Галушко, 1980: 248; Танфильев, Кононов, 1987: 74); **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** Асо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 248); **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т** (Ахундов, 1955: 373).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ирак, Иран), Ср. Азия.

Родовой статус принят в силу укрепившейся в Европе традиции. Образует не более чем секцию рода *Chaerophyllum*, второй же вид этого родства — *Chaerophyllum pro-cumbens* Lam. — обитает в Сев. Америке.

9 (14). *Chaerophyllum* L.

1 (30). *C. aromaticum* L. 1753, Sp. Pl.: 259.

Описан из Европы.

ЗЗ: Абх. (заносное).

Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.

2 (31). *C. aureum* L. 1762, Sp. Pl. ed. 2: 370. — *C. maculatum* Willd. 1814, Enum. Pl. Horti Berol.: 15. — *C. temuloides* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 64, sec. Hedge et Lamond, 1972, Fl. Turk. 4: 315.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ; Т:**

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев. Турция, сев. Иран).

3 (32). *C. hirsutum* L. 1753, Sp. Pl.: 258. — *C. cicutaria* Vill. 1787, Hist. Pl. Dauph. 2: 664.

Описан из Швейцарии.

Указан для **ЗК:** Бело-Лаб. (Тамамшян, 1967: 31; Галушко, 1980: 250), Уруп-Теб. (Галушко, 1980: 250).

Центр., Южн., Вост. Европа.

4 (33). *C. humile* Steven ex Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 240. — *C. kiarazi* Woronow ex Schischk. 1950, Фл. СССР, 16: 590.

Описан из Грузии. Т у р у с: «Iberia, Ksani, Steven» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Эндемик.

5 (34). *C. roseum* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 234. — *C. millefolium* DC. 1830, Prodr. 4: 226.

Описан из Грузии. Л е с т о т у р у с (Menitsky, hoc loco): «Ex Caucaso iberico, 1806, Steven» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Дмитриева, 1990: 150).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

6 (35). *C. rubellum* Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 105.

Описан из Западного Закавказья. С у н т у р и: «Circassia, ad summam rupes montium Khag et Adzituko, alt. 2700–2800 m, 1894, №№ 161, 162 bis, N. Albov» (G?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.