

Описан с Западного Кавказа. *Typus*: «Teberda, ad fl. В. Chatipara in frutices, ca 1400 m s. m., 11 VII 1951, W. Woroschilov» (МНА).

ЗП; ВП: Тер.-Кум.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ**: Ерев., Севан., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ВП**: В. Ставр. (Танфильев, Кононов, 1987: 98); **ЗК**: Адаг.-Пшиш., В. Куб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 124), Инг.-Рион. (Капеллер, 1964: 307), Адж. (Колаковский, 1961: 456); **ЦЗ**: Лори; **ЮЗ**: Дар., Занг. (Аветисян, 1980: 119).

Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран).

Видовая самостоятельность приведенных для Кавказа А. А. Гроссгеймом (1934: 46) *V. nitida* Kreyer, *V. provisa* Kreyer и *V. palustris* Kreyer отвергается монографом лекарственной валерианы В. Н. Ворошиловым (1975). Следует отметить, что расовый состав лекарственных валериан на Кавказе недостаточно изучен и необходимы популяционные исследования в природе и при интродукции, которые позволят выявить изменчивость их признаков.

12 (316). **V. colchica** Utkin, 1921, Бот. мат. Герб. Главн. бот. сада РСФСР, 2: 160.

Описан с Западного Кавказа. *Lectotypus* (Михеев, 1994: 107): «Гора Аибга, около 3 балаганов, выс. 6000 ф., 1916, И. Куприянов» (LE!).

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир. (Колаковский, 1961: 456; Гагнидзе, Гургенидзе, 2001: 63), Адж. (Капеллер, 1964: 307; Гагнидзе, Гургенидзе, 2001: 63); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Гагнидзе, Гургенидзе, 2001: 63).

Эндемик.

2 (93). **Centranthus** DC.

1 (317). **C. longiflorus** Steven, 1829, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 1 (7): 272. — *Valeriana angustifolia* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 24, non *Centranthus angustifolius* DC. 1805.

Описан из Грузии. *Lectotypus* (Михеев, 1994: 108): «Ex Iberia, Tiflin [Bieberstein]» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Нах.

Указан для **ЗЗ**: Абх. (редко, заносное) (Колаковский, 1986: 88; Гургенидзе, 2001: 66), Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ**: Мург.-Муровд., Караб. (Гроссгейм, 1934: 44); **ЮЗ**: Дар. (Аветисян, 1980: 122).

Юго-Вост. Европа (Болгария); Средиз. (Греция, сев.-зап. Африка); Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан).

3 (94). **Valerianella** Mill.

Sect. 1. **Psilocaelae** DC.

1 (318). **V. uncinata** (Bieb.) Dufur. 1811, Hist. Valer.: 60. — *Valeriana uncinata* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 26. — *V. pubescens* Germann, 1805, Bot. Zeit. (Regensb.), 4: 360, non Mérat, 1812. — *Valerianella pubescens* Krok, 1864, Kungl. Sv. Vet.-Acad. Handl. 5, 1: 48.