

22 (339). **V. leiocarpa** (C. Koch) Kuntze, 1887, Тр. Петерб. бот. сада, 10: 195. — *Dufresnia leiocarpa* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 34. — *D. orientalis* DC. 1830, Prodr. 4: 625, non *Valerianella orientalis* (Schlecht.) Boiss. et Buhse, 1856. — *Valerianella dufresnia* Bunge ex Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 109.

Описан из Армении («Inter segetes Armeniae»).

ЮЗ: Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Карягин, 1961: 77); **ЮЗ:** Дар. (Аветисян, 1980: 135).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Палестина, сев. Ирак, Иран, Афганистан, зап. Пакистан), Ср. Азия.

4 (95). **Pseudobetckea** (Höck) Lincz.

1 (340). **P. caucasica** (Boiss.) Lincz. 1958, Фл. СССР, 23: 740. — *Betckea caucasica* Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 94. — *Valerianella caucasica* (Boiss.) Höck, 1891, in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 4, 4: 177.

Описан из Дагестана. *Lectotypus* (Ильинская, 1954: 339, «голотип»; Михеев, 1994: 112; Фёдоров, 1952, in sched.): «Inter Aknada et Ratlu-Achwach, 1590–1608 hex., 13 VII 1861, Ruprecht» (LE!).

ВК: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для: **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек. (Гагнидзе, 2001: 80).

Эндемик.

Fam. 127. **DIPSACACEAE** Juss.*

1 (96). **Knautia** L.

1 (341). **K. arvensis** (L.) Coult. 1824, Mém. Dipsac.: 41. — *Scabiosa arvensis* L. 1753, Sp. Pl.: 99. — *S. campestris* Andrz. ex Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 7.

Описан из Европы.

ЦК: Малк.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Гроссгейм, 1934: 53; Галушко, 1980: 128); **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Гроссгейм, 1934: 53; Шхиян, 1952: 89).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2 (342). **K. montana** (Bieb.) DC. 1830, Prodr. 4: 651. — *Scabiosa montana* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 95. — *Knautia heterotricha* C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 444.

Описан с Северного Кавказа («in pratis montanis Caucasi subalpini, circa acidulam Narzana et castellum Wladi-Kawkas»). *Typus*: «Ex Caucaso rutheno circa acidulam Narzana, Bieberstein» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.

* Ю. Л. Меницкий (Меницкий, 1992), А. Д. Михеев.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 129); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт. (Шхиян, 1952: 90), Лори (Гроссгейм, 1934: 54), **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Ширв. (Прилипко, 1961: 99); **ЮЗ**: Занг. (Гроссгейм, 1934: 54).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

3 (343). **K. involucrata** Sommier et Levier, 1893, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 1: 46. — *K. integrifolia* C. Koch, 1851, Linnaea, 24: 443, non Bertol. 1835. — *K. flaviflora* Borb. 1894, Magyar Orv. Munk.: 276. — *K. montana* (Bieb.) DC. subsp. *involucrata* (Sommier et Levier) Schchian, 2001, Фл. Груз. изд. 2, 13: 123.

Описан из Западного Закавказья (Сванетии). Т у р u s : «In monte Tetenar supra Tsholur, in pascuis alpinis 2300 m, 1 VIII 1890, № 634, Sommier et Levier» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан.

Указан для многих районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 129); **ЗК**: Уруп-Теб. (Танфильев, Кононов, 1987: 98). Едва ли все экземпляры правильно определены цитируемыми авторами.

Юго-Зап. Азия (сев. Турция).

4 (344). **K. orientalis** L. 1753, Sp. Pl.: 101. — *K. propontica* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1666.

Описан с «Востока».

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1934: 53; Шхиян, 2001: 124). Указание сомнительно; гербарных сборов в LE и ТВ1 нет.

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев., вост. Турция).

2 (97). **Dipsacus** L.

1 (345). **D. laciniatus** L. 1753, Sp. Pl.: 97.

Описан из Европы.

ЗП; **ЗК**: Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум., В. Тер.; **ВК**: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнич., Ширв., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т**.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Лори; **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Гроссгейм, 1934: 48; Шхиян, 1952: 77); **ЮЗ**: Ю. Караб. (Прилипко, 1961: 90).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (346). **D. fullonum** L. 1753, Sp. Pl.: 97. — *D. sylvestris* Huds. 1762, Fl. Angl.: 49.

Описан из Европы.

Указан для **ЗП**: Аз.-Куб. (Галушко, 1980: 129); **ЦК**; **СЗЗ** (Гроссгейм, 1934: 48). Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

3 (347). **D. gmelinii** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 92.

Описан из Восточного Предкавказья («ad rivum Kumam, circa ruinas urbis antiquae Maschar»). Т у р u s : «Spont. ad rivum Kumam, 1806, Steven» (LE!).

ВП: В. Ставр.; ? Тер.-Кум.

Эндемик.