

Описан по культивированным в Вене экземплярам; место происхождения исходного материала неизвестно. Е. Г. Бобров (1957: 81) предполагал таковым Тальш. *Lectotypus* (Menitsky, Mikheev, hoc loco): J. Jacq. 1813, l. c. tab. 59.

**ЗЗ:** Адж.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

14h. **S. adzharica** Schchian, 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 117.

Описан из Аджарии. *Турус:* «Аджаро-Имеретинский хр., участок Катриани, Самцховрия, 7 VIII 1914, Е. Кикодзе» (ТВИ; *isotypus* — LE!).

**ЗЗ:** Рион.-Квир., Адж.; **ЮЗЗ:** Месх.

Эндемик?

## Fam. 128. MORINACEAE Raf.\*

### 1 (103). *Morina* L.

1 (385). **M. persica** L. 1753, Sp. Pl.: 28; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 47. — *M. orientalis* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8. — *M. verticillata* Moench, 1802, Suppl. Meth.: 186. — *M. wallichiana* Royle, 1839, Ill. Bot. Himal. Mount. 55: 245. — *M. tournefortii* Jaub. et Spach. 1854, Ill. Pl. Or. 5: 31. — *M. aucheri* Jaub. et Spach. 1854, l. c.: 32. — *M. graeca* Jaub. et Spach. 1854, l. c.: 32. — *M. persica* L. subsp. *turcica* Halácsy, 1891, Österr. Bot. Zeitschr. 41: 409. — *M. turcica* (Halácsy) Degen et Halácsy ex Čelak. 1893, Bot. Jahrb. 17: 396.

Описан из Ирана.

Возможно нахождение в **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, сев. Сирия, Ливан, Иран, Афганистан, Пакистан), Южн. (Кашмир) Азия.

## Superordo Asteranae

### ORDO 61. CAMPANULALES

## Fam. 129. CAMPANULACEAE Juss.\*\*

### 1 (104). *Campanula* L.

#### Subgen. 1. *Quinqueloculares* (C. Koch) Charadze

1 (386). **C. crispa** Lam. 1785, Encycl. Méth. Bot. 1: 581. — *Quinquelocularia crispa* (Lam.) C. Koch, 1850, Linnaea, 22: 631.

Описан из северо-восточной Турции (Карс). *Турус:* «*Campanula orientalis*, foliorum crenis amplioribus et crispis, flore patulo» (P-TRF, № 335).

**ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (Боржоми); **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев. (ущелья рек Мармарик, Касак, Гегамский хр.).

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев.-зап. Иран).

\* В. В. Шванова.

\*\* М. Э. Оганесян.