

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

### Subgen. 11. *Gadellia* (Schulkinina) Victorov

68 (453). *C. lactiflora* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 153. — *C. biserrata* C. Koch, 1847, Linnaea, 19: 29. — *C. celtidifolia* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 111. — *Gadellia lactiflora* (Bieb.) Schulkinina, 1979, Новости сист. высш. раст. 16: 153.

Описан с Центрального Кавказа. *Lectotypus* (Викторов, 2002:232): «Wladi-Kawkas, Kaischaur» (LE!, sub *C. aspera*).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **БК; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх. (Абастумани).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

### 2 (105). *Legousia* Durande

1 (454). *L. falcata* (Ten.) Fritsch, 1907, Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, 5: 100. — *Prismatocarpus falcatus* Ten. 1812, Prodr. Fl. Nap. 1: 16, tab. 20.

Описан из Италии.

? **ЦК:** В. Тер. (Алагир); **ЗЗ:** Абх.; **ЮЗ:** Мерп.-Зан.

Средиз.; Юго-Зап. (юго-вост. Турция, сев. Ирак, зап. и южн. Иран), Ср. (горн. Туркмения) Азия.

Местонахождение в окр. Алагира (Лаговский, LE!) сомнительно.

2 (455). *L. hybrida* (L.) Delarbre, 1800, Fl. Auvergne, ed. 2, 2: 47. — *Campanula hybrida* L. 1753, Sp. Pl.: 168.

Описан по материалам из Англии и Франции («in Anglia, Gallia, inter segetes»).

**СЗЗ:** Анап.-Гел. (Новороссийск); **ВЗ:** Н. Кур. (Карадаглы); **ЮЗ:** Ю. Караб. (Гамзалы); **Т:**

Европа (кроме сев.-вост.); Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

3 (456). *L. speculum-veneris* (L.) Chaix, 1786, in Vill. Hist. Pl. Dauph. 1: 338. — *Campanula speculum-veneris* L. 1753, Sp. Pl.: 168. — *Specularia speculum* A. DC. 1830, Monogr. Camp.: 346. — *Legousia speculum* Fisch. ex A. DC. 1830, l. c.: 347.

Описан из Южной Европы. *Lectotypus* (Pistarino, Jarvis, 2007: 379, in Jarvis (ed.), Order out of Chaos): Herb. Burser, № 221.68 (LINN).

? **ЦК:** В. Тер. (Ардон).

Центр., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап. Сирия, сев. Ирак, зап. Иран).

Единственное местонахождение на Кавказе («В верховьях Ардона, Dr. Lagowsky», LE!) очень сомнительно.

4 (457). *L. pentagonia* (L.) Thell. 1907, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 52: 465. — *Campanula pentagonia* L. 1753, Sp. Pl.: 169.

Описан из Греции. *Lectotypus* (Oganesian, 1995: 303, «typus»): Herb. Clifford, № 64, Campanula 14 (BM, photo!).

**ЗЗ:** Адж. (Батуми).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (вост. Турция, зап. Сирия, сев. Ирак, зап. Иран).

### 3 (106). *Asyneuma* Griseb. et Schenk

1 (458). **A. amplexicaule** (Willd.) Hand.-Mazz. 1913, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 27: 431. — *Phyteuma amplexicaulis* Willd. 1798, Sp. Pl. 1, 2: 925.

Описан с «Востока». Т у р у s: «*Rapunculus orientalis, campanulae patensis folio*» Tournefort (B-WILLD, № 3898).

1а. **A. amplexicaule** (Willd.) Hand.-Mazz. subsp. **amplexicaule**. — *A. talyschense* Fed. 1957, Фл. СССР, 24: 473, 407.

**ЗЗ**: Адж. (Шавшетский хр.); **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос. (Боржоми), Лори (зап.); **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Нах. (Зангезурский хр.), Занг., Мерг.-Зан.; **Т**.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Ирак, сев. Иран).

2 (459). **A. campanuloides** (Bieb. ex Sims) Bornm. 1921, Beih. Bot. Centralbl. 38, 2: 340. — *Phyteuma campanuloides* Bieb. ex Sims, 1807, Curtis's Bot. Mag. 25: tab. 1015. — *P. campanuloides* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 156. — *P. marschalliana* Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 11: 77.

Описан по образцам, выращенным из семян, полученных с Кавказа («raised from seeds, received from Mount Caucasus», Loddiges). Л е с т о т у р у s (Damboldt, 1970: 45): Sims, 1807, Curtis's Bot. Mag. 25: tab. 1015!

**ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК**; **ВК**; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб. (хр. Муров); **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев. (басс. р. Мармарик), Севан., Занг.

Эндемик? Вероятно произрастает также в Юго-Зап. Азии (сев.-вост. Турция).

3 (460). **A. rigidum** (Willd.) Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 426. — *Phyteuma rigida* Willd. 1798, Sp. Pl. 1, 2: 925.

Описан из Турции? Т у р у s: «*Rapunculus armenus altissimus folio glabro et rigido, Tournefort*» (B-WILLD, № 3894; isotypus — P-TRF, № 366).

3а. **A. rigidum** (Willd.) Grossh. subsp. **rigidum**. — *Phyteuma lanceolata* Willd. 1798, Sp. Pl. 1, 2: 924, non Vill. 1787. — *Asyneuma lanceolata* (Willd.) Hand.-Mazz. 1913, Ann. Naturh. Mus. (Wien), 27: 431. — *A. grossheimii* Karjagin ex Grossh. 1949, Опред. раст. Кавк.: 425.

**ВК**: Ман.-Самур. (сел. Мекеге, Куруш, Ялужох), Кубин. (горы Калахоудаг, Шахдаг); **ЦЗ**; **ВЗ**: Мург.-Муровд. (гора Зиарат); **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: все районы, кроме Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Ирак, сев.-зап. Иран).

4 (461). **A. pulchellum** (Fisch. et C. A. Mey.) Bornm. 1921, Beih. Bot. Centralbl. 38, 2: 348. — *Phyteuma pulchellum* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 35.

Описан по материалам из Талыша («In locus aridis lapidosis Talüsch prope pagos Siwiris et Swant; alt. 670–1100 hexar.»). Единственный известный ауентик: «Juni ... in Swant» (LE!)