

**ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**  
Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, сев. и зап. Иран).

5 (462). **A. virgatum** (Labill.) Bornm. 1921, Beih. Bot. Centralbl. 38, 2: 351. — *Catranula virgata* Labill. 1791, Icon. Pl. Syg. Rar. 2: 11, tab. 6.

Описан из Ливана. Т у р у с: «In Libano, Labillardiere» (G, cum isotypo).

5а. **A. virgatum** (Labill.) Bornm. subsp. **virgatum**. — *Phyteuma leianthum* Trautv. 1874, Тр. Петерб. бот. сада, 3: 274.

**ЮЗЗ:** Араг. (Ширак).

Юго-Зап. Азия (Турция, Ливан, зап. Иран).

#### 4 (107). **Michauxia** L'Hér.

1 (463). **M. laevigata** Vent. 1800, Hort. Cels.: 81. — *Mindium laevigatum* (Vent.) Rech. f. et Schiman-Czeika, 1965, Fl. Iran. 13: 47.

Описан из северного Ирана. Т у р у с: «Persia, sur le mont Alburs, Bruguere et Olivier» (P).

**ЮЗ:** Ерев. (юго-вост.), Дар., Нах., Занг. (юг), Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, Иран).

#### 5 (108). **Muehlenbergella** Feer

1 (464). **M. oweriniana** (Rupr.) Feer, 1890, Bot. Jahrb. 12: 616. — *Edrajanthus owerinianus* Rupr. 1867, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 11: 203 («*Hedranthus*»).

Описан из Дагестана («Daghestania bor., in prov. Koissubu, infra montes Erpeli, in fissuris rupium calcarearum regionis «Machi», in umbrosis, fine Julii, corollis emarcidis et sem. maturis lect. com. D. Owerin»). Т у р у с: «Erpeli, in... Herbarium Trautvetter» (LE!).

**ВК:** В. Сулак. (окр. сел. Гимри, Эрпели, В. Ботлих).

Эндемик.

### ORDO 62. MENYANTHALES

#### Fam. 130. **MENYANTHACEAE** Dumort.\*

##### 1 (109). **Menyanthes** L.

1 (465). **M. trifoliata** L. 1753, Sp. Pl.: 145.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК; ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур;

**ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг.

Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

\* Ю. Л. Меницкий.

## 2 (110). *Nymphoides* Ség.

1 (466). *N. peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891, Rev. Gen. 2: 429. — *Limnanthemum peltatum* S. G. Gmel. 1770, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 14, 1: 527. — *Menyanthes nymphoides* L. 1753, Sp. Pl.: 145.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап. (сев.-зап. Иран), Ср. (сев.), Центр., Вост. Азия.

## ORDO 63. ASTERALES

Fam. 131. **ASTERACEAE** Bercht. et J. Presl

Subfam. 1. **ASTEROIDEAE** (Cass.) Lindl.

Ttrib. 1. **Eupatorieae** Cass.\*

Subtrib. 1. **Ageratinae** O. Hoffm.

### 1 (111). *Ageratum* L.

1 (467). *A. houstonianum* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 2. — *A. obtusifolium* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 54. — *A. mexicanum* Sims, 1824, Curtis's Bot. Mag. 52: tab. 2524; Кут. 1952, Фл. Груз. 8: 214. — *A. conyzoides* L. var. *houstonianum* (Mill.) Sahu, 1982, Feddes Repert. 93, 1-2: 64. — *A. conyzoides* L. subsp. *houstonianum* (Mill.) M. Sharma, 1984, Geobios, New. Rep. 3, 2: 152. — *A. conyzoides* auct. non L.: Кут. 1952, цит. соч.: 215.

Описан из Мексики.

**ЗЗ:** Адж. (Салибаури, Батумский бот. сад.). Культивируется и дичает. Южн., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. Америка.

### 2 (112). *Stevia* Cav.

1 (468). *S. ovata* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 855. — *S. paniculata* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 27; Колак. 1949, Фл. Абх. 4: 191; Сахок. 1952, Фл. Груз. 8: 215.

Описан из Мексики.

Указан как сорное для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1949: 191).

Сев., Центр. Америка.

### 3 (113). *Eupatorium* L.

1 (469). *E. cannabinum* L. 1753, Sp. Pl.: 838. — *E. caucasicum* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 371. — *E. hyrcanicum* Steven, 1856, l. c.: 371.

\* Ю. Л. Меницкий.