

2 (110). *Nymphoides* Ség.

1 (466). *N. peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891, Rev. Gen. 2: 429. — *Limnanthemum peltatum* S. G. Gmel. 1770, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 14, 1: 527. — *Menyanthes nymphoides* L. 1753, Sp. Pl.: 145.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. (юг), Юго-Зап. (сев.-зап. Иран), Ср. (сев.), Центр., Вост. Азия.

ORDO 63. ASTERALES

Fam. 131. **ASTERACEAE** Bercht. et J. Presl

Subfam. 1. **ASTEROIDEAE** (Cass.) Lindl.

Ttrib. 1. **Eupatorieae** Cass.*

Subtrib. 1. **Ageratinae** O. Hoffm.

1 (111). *Ageratum* L.

1 (467). *A. houstonianum* Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8, № 2. — *A. obtusifolium* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 54. — *A. mexicanum* Sims, 1824, Curtis's Bot. Mag. 52: tab. 2524; Кут. 1952, Фл. Груз. 8: 214. — *A. conyzoides* L. var. *houstonianum* (Mill.) Sahu, 1982, Feddes Repert. 93, 1-2: 64. — *A. conyzoides* L. subsp. *houstonianum* (Mill.) M. Sharma, 1984, Geobios, New. Rep. 3, 2: 152. — *A. conyzoides* auct. non L.: Кут. 1952, цит. соч.: 215.

Описан из Мексики.

ЗЗ: Адж. (Салибаури, Батумский бот. сад.). Культивируется и дичает. Южн., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. Америка.

2 (112). *Stevia* Cav.

1 (468). *S. ovata* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol.: 855. — *S. paniculata* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 27; Колак. 1949, Фл. Абх. 4: 191; Сахок. 1952, Фл. Груз. 8: 215.

Описан из Мексики.

Указан как сорное для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1949: 191).

Сев., Центр. Америка.

3 (113). *Eupatorium* L.

1 (469). *E. cannabinum* L. 1753, Sp. Pl.: 838. — *E. caucasicum* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2: 371. — *E. hyrcanicum* Steven, 1856, l. c.: 371.

* Ю. Л. Меницкий.