

101 (211). *Cnicus* L.*

1 (1080). *C. benedictus* L. 1753, Sp. Pl.: 826. — *Centaurea benedicta* (L.) L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1296. — *Carbenia benedicta* (L.) Benth. 1873, in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 482.

Описан из Средиземноморья. *Lectotypus* (Jeffrey, 1968: 138): Herb. Clifford: 394, *Cnicus* 1 (BM, № 000646941).

ВЗ: Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Иджев.), Н. Кур., **ЮЗЗ:** Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

В Армении встречаются 2 разновидности этого полиморфного вида: *var. benedictus* и *var. kotschyi* Boiss., которые различаются по величине семянки и длине паппуса. Семянка первой разновидности достигает 7–9 мм дл., со щетинками паппуса, равными 8–12 мм дл., второй — 4,5–8 мм дл., со щетинками 3–6 мм дл. Типовая разновидность в Армении довольно широко распространена, тогда как *var. kotschyi* встречается реже и только в Ереванском, Дарелегисском и Мегринском флористических районах, а также в Нахичевани (Садарак, Азнаберд, Шахбуз).

102 (212). *Carthamus* L.*

1 (1081). *C. gypsicola* Iljin, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 3–4: 357.

Описан из Средней Азии. *Т у р у s*: «Distr. Turgai, Besirk Kisil-dzingil, am Sary-subei Tes-bulak, 9 VI 1914, № 5218, L. M. Krascheninnikov» (LE!; *isotypus* — G!).

ЮЗ: Ерев., Дар., Мегр.-Зан., Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2 (1052). *C. oxyacanthus* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 118.

Описан из Восточного Закавказья («inter segetes in vicina rivulorum Ata et Giljen, nec alibi»). *Т у р у s*: «Schirwan, Bieberstein» (LE!).

ВК: Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. Азия.

3 (1083). *C. tinctorius* L. 1753, Sp. Pl.: 830.

Описан из Египта («Habitat in Aegypto»). *Lectotypus* (Rechinger, 1980: 434): Herb. Clifford: 394, *Carthamus* 1 (BM, № 000646936).

ВЗ: Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах. (культивируется и дичает).

Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция, Иран, Афганистан), Юго-Вост., Южн. (Индия) Азия.

4 (1084). *C. glaucus* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 118. — *Kentrophyllum syriacum* Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 98. — *Carthamus glaucus* Bieb. *var. syriacus* (Boiss.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 707, p. p. — *C. syriacus* (Boiss.) Dinsm. 1933, in Post, Fl. Syria, 2: 121.

* Э. Ц. Габриэлян.