

## 101 (211). *Cnicus* L.\*

1 (1080). *C. benedictus* L. 1753, Sp. Pl.: 826. — *Centaurea benedicta* (L.) L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1296. — *Carbenia benedicta* (L.) Benth. 1873, in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 482.

Описан из Средиземноморья. *Lectotypus* (Jeffrey, 1968: 138): Herb. Clifford: 394, *Cnicus* 1 (BM, № 000646941).

**ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Иджев.), Н. Кур., **ЮЗЗ:** Араг. (Ширак); **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

В Армении встречаются 2 разновидности этого полиморфного вида: *var. benedictus* и *var. kotschyi* Boiss., которые различаются по величине семянки и длине паппуса. Семянка первой разновидности достигает 7–9 мм дл., со щетинками паппуса, равными 8–12 мм дл., второй — 4,5–8 мм дл., со щетинками 3–6 мм дл. Типовая разновидность в Армении довольно широко распространена, тогда как *var. kotschyi* встречается реже и только в Ереванском, Дарелегисском и Мегринском флористических районах, а также в Нахичевани (Садарак, Азнаберд, Шахбуз).

## 102 (212). *Carthamus* L.\*

1 (1081). *C. gypsicola* Iljin, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 3–4: 357.

Описан из Средней Азии. *Т у р у s*: «Distr. Turgai, Besirk Kisil-dzingil, am Sary-subei Tes-bulak, 9 VI 1914, № 5218, L. M. Krascheninnikov» (LE!; *isotypus* — G!).

**ЮЗ:** Ерев., Дар., Мегр.-Зан., Нах.

Юго-Зап. (Иран), Ср. Азия.

2 (1052). *C. oxyacanthus* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 118.

Описан из Восточного Закавказья («inter segetes in vicina rivulorum Ata et Giljen, nec alibi»). *Т у р у s*: «Schirwan, Bieberstein» (LE!).

**ВК:** Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. Азия.

3 (1083). *C. tinctorius* L. 1753, Sp. Pl.: 830.

Описан из Египта («Habitat in Aegypto»). *Lectotypus* (Rechinger, 1980: 434): Herb. Clifford: 394, *Carthamus* 1 (BM, № 000646936).

**ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах. (культивируется и дичает).

Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция, Иран, Афганистан), Юго-Вост., Южн. (Индия) Азия.

4 (1084). *C. glaucus* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 118. — *Kentrophyllum syriacum* Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 98. — *Carthamus glaucus* Bieb. *var. syriacus* (Boiss.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 707, p. p. — *C. syriacus* (Boiss.) Dinsm. 1933, in Post, Fl. Syria, 2: 121.

\* Э. Ц. Габриэлян.

Описан из Закавказья. *Syn t y p i*: «E Caucaso Schirwanico et ex Iberia, a 1796 et 1807, M. Bieberstein» (LE!).

**СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВК**: Кубин.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнч., Шнрв., Караб.; **ЮЗ**: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Зуванд). Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, зап. Иран).

5 (1085). **C. lanatus** L. 1753, Sp. Pl.: 830. — *C. creticus* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1163. — *C. tauricus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 285. — *Kentrophyllum lanatum* DC. 1838, Prodr. 6: 610 — *K. tauricum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 66.

Описан из Средиземноморья. *L e c t o t y p u s* (Hanelt, 1963: 136): Herb. Linn., № 973.2 (LINN!).

**ЗЗ**: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнч., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Иджев.), Караб.

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция), Ср. Азия.

6 (1086). **C. turkestanicus** Popov, 1941, Тр. Узб. унив. 2: 36. — *C. lanatus* L. subsp. *turkestanicus* (Popov) Hanelt, 1963, Feddes Repert. 67: 148.

Описан из Средней Азии. *T y p u s*: «Fergana, Kreis Andishan, linkes Uber des Kugart, № 1087, Knorring et V. Minkwitz» (LE!).

**ЮЗЗ**: Араг.; **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Иджев.); **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Занг.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

Во «Флоре СССР» (Шостаковский, 1963) указано, что этот вид является гибридом между *C. lanatus* и *C. oxyacanthus*. Однако он довольно близок только к первому.

7 (1087). **C. tamamschjanae** Gabrieljan, 1987, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 10: 21.

Описан из Южного Закавказья. *T y p u s*: «АрмССР, Ехегнадзорский р-н, между городом Ехегнадзор и с. Малишка, на сухих каменистых склонах, на высоте 1300 м над ур. м., 1 X 1982, Н. Ханджян» (ERE!; isotypus — LE!).

**ЮЗ**: Дар.

Эндемик Армении.

### 103 (213). **Oligochaeta** (DC.) C. Koch\*

1 (1088). **O. divaricata** (Fisch. et C. A. Mey.) C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 43. — *Serratula divaricata* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 37. — *Microlonchus oligochaetus* Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 701. — *Cousinia massalskyi* C. Winkl. 1889, Тр. Петерб. бот. сада, 11: 131. — *Centaurea oligochaeta* (Boiss.) Bornm. 1916, Beih. Bot. Centralbl. 34, 2: 293.

Описан из северо-западного Ирана. *T y p u s*: «In collibus siccis et sterilibus per Dtum (distr.) Khoi prov. Aderbeidzan, 16 V 1828, № 231, Szovits» (LE!; isotypi — G!, LE!, W!).

**ЮЗЗ**: Месх., Араг. (Бюракан); **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция: долина Аракса; сев.-зап. и сев. Иран).

\* Э. Ц. Габриэлян.