

Описан из Закавказья. *Syn t y p i*: «E Caucaso Schirwanico et ex Iberia, a 1796 et 1807, M. Bieberstein» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВК**: Кубин.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнч., Шнрв., Караб.; **ЮЗ**: Дар., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Зуванд). Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, зап. Иран).

5 (1085). **C. lanatus** L. 1753, Sp. Pl.: 830. — *C. creticus* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1163. — *C. tauricus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 285. — *Kentrophyllum lanatum* DC. 1838, Prodr. 6: 610 — *K. tauricum* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 66.

Описан из Средиземноморья. *L e c t o t y p u s* (Hanelt, 1963: 136): Herb. Linn., № 973.2 (LINN!).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ**: Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ**: Алаз.-Агрнч., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд. (Иджев.), Караб.

Атл., Центр., Юго-Вост., Вост. (юг) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция), Ср. Азия.

6 (1086). **C. turkestanicus** Popov, 1941, Тр. Узб. унив. 2: 36. — *C. lanatus* L. subsp. *turkestanicus* (Popov) Hanelt, 1963, Feddes Repert. 67: 148.

Описан из Средней Азии. *T y p u s*: «Fergana, Kreis Andishan, linkes Uber des Kugart, № 1087, Knorring et V. Minkwitz» (LE!).

ЮЗЗ: Араг.; **ВЗ**: Мург.-Муровд. (Иджев.); **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Занг.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

Во «Флоре СССР» (Шостаковский, 1963) указано, что этот вид является гибридом между *C. lanatus* и *C. oxyacanthus*. Однако он довольно близок только к первому.

7 (1087). **C. tamamschjanae** Gabrieljan, 1987, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 10: 21.

Описан из Южного Закавказья. *T y p u s*: «АрмССР, Ехегнадзорский р-н, между городом Ехегнадзор и с. Малишка, на сухих каменистых склонах, на высоте 1300 м над ур. м., 1 X 1982, Н. Ханджян» (ERE!; isotypus — LE!).

ЮЗ: Дар.

Эндемик Армении.

103 (213). **Oligochaeta** (DC.) C. Koch*

1 (1088). **O. divaricata** (Fisch. et C. A. Mey.) C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 43. — *Serratula divaricata* Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 37. — *Microlonchus oligochaetus* Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 701. — *Cousinia massalskyi* C. Winkl. 1889, Тр. Петерб. бот. сада, 11: 131. — *Centaurea oligochaeta* (Boiss.) Bornm. 1916, Beih. Bot. Centralbl. 34, 2: 293.

Описан из северо-западного Ирана. *T y p u s*: «In collibus siccis et sterilibus per Dtum (distr.) Khoi prov. Aderbeidzan, 16 V 1828, № 231, Szovits» (LE!; isotypi — G!, LE!, W!).

ЮЗЗ: Месх., Араг. (Бюракан); **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция: долина Аракса; сев.-зап. и сев. Иран).

* Э. Ц. Габриэлян.

2 (1089). **O. tomentosa** Czer. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 455.

Описан из Восточного Закавказья. Т у р у s: «Transcaucasia, Azerbajdzhan, pr. Gandzha, distr. Kasum-Ismaily prope locum Naftalan, in siccis, 7 VI 1933, A. Grossheim» (LE!, cum isotуро).

ВЗ: Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Мерг.-Зан., Ю. Караб.
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

104 (214). **Crupina** Cass.*

1 (1090). **C. crupinastrum** (Moris) Vis. 1847, Fl. Dalmat. 2: 42. — *Centaurea crupinastrum* Moris, 1842, Enum. Sem. Horti Taur.: 12. — *C. zuccarini* Bunge ex Nyman, 1879, Consp. Fl. Eur. 2: 433.

Описан из Италии («Sardinia»). Т у р у s: ТО?

ВК: Ман.-Самур. (Дербент), Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв. (Шемаха), Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг. (юг), Мерг.-Зан., Ю. Караб. (юг); **Т:**

Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. Азия.

2 (1091). **C. vulgaris** Cass. 1818, Dict. Sci. Nat. 12: 68. — *C. pauciflora* Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 392. — *Centaurea crupina* L. 1753, Sp. Pl.: 909. — *Serratula crupina* (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauph. 3: 38.

Описан из Европы («Gallia, Italia»). Т у р у s: Herb. Linn., № 1030/1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб. (юг); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб. (сев.); **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Лечхуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек. (вост.), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцих), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.; **Т:**

Юго-Вост. Европа (Крым); Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

3 (1092). **C. intermedia** (Mutel) Walp. 1849, Ann. Bot. Syst. 1: 447. — *Centaurea intermedia* Mutel, 1846, in Duch. Rev. Bot. 1: 400. — *Crupina vulgaris* Cass. var. *intermedia* (Mutel) Batt. 1890, in Batt. et Trab. Fl. Algér. (Dicot.): 492.

Описан из Алжира. Т у р у s: «Collines boisées près d'Algér» (G — Herb. Delessert!).

ЮЗ: Мерг.-Зан. (между Легвазом и Курисом).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран), Сев. Африка (Алжир).

Subfam. 2. LACTUCOIDEAE Solbrig

Trib. 1. **Lactuceae** Adans. (= *Cichorieae* Spreng.)

Subtrib. 1. **Scolyminae** Less.**

105 (215). **Scolymus** L.

1 (1093). **S. hispanicus** L. 1753, Sp. Pl.: 813. — *Myscolus microcephalus* Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 34: 85. — *M. hispanicus* (L.) D. Dietr. 1847, Syn. Pl. 4: 1333.

* Э. Ц. Габриэлян.

** Ю. Л. Меницкий.