

2 (1089). **O. tomentosa** Czer. 1959, Бот. мат. (Ленинград), 19: 455.

Описан из Восточного Закавказья. Т у р у s: «Transcaucasia, Azerbajdzhan, pr. Gandzha, distr. Kasum-Ismaily prope locum Naftalan, in siccis, 7 VI 1933, A. Grossheim» (LE!, cum isotуро).

ВЗ: Мург.-Муровд; **ЮЗ:** Мерг.-Зан., Ю. Караб.
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

104 (214). **Crupina** Cass.*

1 (1090). **C. crupinastrum** (Moris) Vis. 1847, Fl. Dalmat. 2: 42. — *Centaurea crupinastrum* Moris, 1842, Enum. Sem. Horti Taur.: 12. — *C. zuccarini* Bunge ex Nyman, 1879, Consp. Fl. Eur. 2: 433.

Описан из Италии («Sardinia»). Т у р у s: ТО?

ВК: Ман.-Самур. (Дербент), Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв. (Шемаха), Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг. (юг), Мерг.-Зан., Ю. Караб. (юг); **Т:**

Средиз.; Юго-Зап. (Ирак, Иран), Ср. Азия.

2 (1091). **C. vulgaris** Cass. 1818, Dict. Sci. Nat. 12: 68. — *C. pauciflora* Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. Moscou, 15: 392. — *Centaurea crupina* L. 1753, Sp. Pl.: 909. — *Serratula crupina* (L.) Vill. 1789, Hist. Pl. Dauph. 3: 38.

Описан из Европы («Gallia, Italia»). Т у р у s: Herb. Linn., № 1030/1 (LINN).

ЗП: Аз.-Куб. (юг); **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб. (сев.); **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Лечхуми); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек. (вост.), Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх. (Ахалцих), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Занг., Мерг.-Зан.; **Т:**

Юго-Вост. Европа (Крым); Средиз.; Юго-Зап. (вост. Турция, Ирак, Иран, Афганистан), Ср. Азия.

3 (1092). **C. intermedia** (Mutel) Walp. 1849, Ann. Bot. Syst. 1: 447. — *Centaurea intermedia* Mutel, 1846, in Duch. Rev. Bot. 1: 400. — *Crupina vulgaris* Cass. var. *intermedia* (Mutel) Batt. 1890, in Batt. et Trab. Fl. Algér. (Dicot.): 492.

Описан из Алжира. Т у р у s: «Collines boisées près d'Algér» (G — Herb. Delessert!).

ЮЗ: Мерг.-Зан. (между Легвазом и Курисом).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран), Сев. Африка (Алжир).

Subfam. 2. LACTUCOIDEAE Solbrig

Trib. 1. **Lactuceae** Adans. (= *Cichorieae* Spreng.)

Subtrib. 1. **Scolyminae** Less.**

105 (215). **Scolymus** L.

1 (1093). **S. hispanicus** L. 1753, Sp. Pl.: 813. — *Myscolus microcephalus* Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 34: 85. — *M. hispanicus* (L.) D. Dietr. 1847, Syn. Pl. 4: 1333.

* Э. Ц. Габриэлян.

** Ю. Л. Меницкий.

Описан по материалам из Южной Европы и Средиземноморья.
ЗП: Аз.-Куб. (Тамань); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; ? **ВЗ:** Н. Кур. (Муганская степь,
7 VI 1898, Б. Левандовский).

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 238).
Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Subtrib. 2. *Cichoriinae* O. Hoffm.*

106 (216). *Cichorium* L.

1 (1094). *C. intybus* L. 1753, Sp. Pl.: 813.

Описан из Европы.

1а. *C. intybus* L. subsp. *intybus*.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Мург-Муровд.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; заносное в Вост. Азии, Америке, Австралии.

1б. *C. intybus* L. subsp. *glabratum* (C. Presl) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 413; Wagenitz a. Bedarff, 1989, in P. H. Davis a. Hedge, Festschrift: 12, comb. superfl.; Цвел. 1989, Фл. европ. части СССР, 8: 17. — *C. glabratum* C. Presl, 1826, Fl. Sicul. 1: 32. — *C. glaucum* Hoffmanns. et Link, 1820, Fl. Portug. 2: 178, tab. 95. — *C. intybus* L. var. *glabratum* (C. Presl) Gren. et Godr. 1851, Fl. Fr. 2: 286. — ? *C. intybus* L. var. *eglandulosus* Freyn et Sint. 1894, Österr. Bot. Zeitschr. 44: 259. — *C. intybus* L. subsp. *glaucum* (Hoffmanns. et Link) Tzvel. 1964, Фл. СССР, 29: 17.

Описан из Средиземноморья (о. Сицилия).

ВК: Кубин. (Дивичи); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич, Ширв., Н. Кур., Мург-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан, Дар., Нах., Занг.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1095). *C. glandulosum* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 87.

Описан из Турции. Syn t y p i: «In ruderatis circa Erzeroum, Huet du Pavillon», «Circa Diarbekir Mesopotamiae, 1843, Kotschy» (G-BOISS; isosyntypa — BM, K).

ЮЗ: Ерев.

Указан для **ЮЗ:** Дар. (Назарова, 1995: 79).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Сирия).

3 (1096). *C. pumilum* Jacq. 1771, Observ. Bot. 4: 3, tab. 80. — *C. divaricatum* Schousb. 1800, Lagttag. Vextr. Marokko: 197; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 716. — *C. intybus* L. var. *divaricatum* (Schousb.) DC. 1838, Prodr. 7: 84. — *C. endivia* L. var. *pumilum* (Jacq.) Vis. 1847, Fl. Dalm. 2: 97. — *C. endivia* L. subsp. *divaricatum* (Schousb.) P. D. Sell, 1976, Bot. Journ. Linn. Soc. (London), 71, 4: 240. — *C. endivia* L. subsp. *pumilum* (Jacq.) C. Jeffrey, 1979, Candollea, 34, 2: 309. — *C. glandulosum* auct. non Boiss. et A. Huet: Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 223; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 502; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 483.

* Ю. Л. Меницкий.