

Описан по материалам из Южной Европы и Средиземноморья.
ЗП: Аз.-Куб. (Тамань); **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион.; ? **ВЗ:** Н. Кур. (Муганская степь,
7 VI 1898, Б. Левандовский).

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (Галушко, 1980: 238).
Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

Subtrib. 2. *Cichoriinae* O. Hoffm.*

106 (216). *Cichorium* L.

1 (1094). *C. intybus* L. 1753, Sp. Pl.: 813.

Описан из Европы.

1а. *C. intybus* L. subsp. *intybus*.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ: Мург-Муровд.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; заносное в Вост. Азии, Америке, Австралии.

1б. *C. intybus* L. subsp. *glabratum* (C. Presl) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 413; Wagenitz a. Bedarff, 1989, in P. H. Davis a. Hedge, Festschrift: 12, comb. superfl.; Цвел. 1989, Фл. европ. части СССР, 8: 17. — *C. glabratum* C. Presl, 1826, Fl. Sicul. 1: 32. — *C. glaucum* Hoffmanns. et Link, 1820, Fl. Portug. 2: 178, tab. 95. — *C. intybus* L. var. *glabratum* (C. Presl) Gren. et Godr. 1851, Fl. Fr. 2: 286. — ? *C. intybus* L. var. *eglandulosus* Freyn et Sint. 1894, Österr. Bot. Zeitschr. 44: 259. — *C. intybus* L. subsp. *glaucum* (Hoffmanns. et Link) Tzvel. 1964, Фл. СССР, 29: 17.

Описан из Средиземноморья (о. Сицилия).

ВК: Кубин. (Дивичи); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич, Ширв., Н. Кур., Мург-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан, Дар., Нах., Занг.; **Т:**

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

2 (1095). *C. glandulosum* Boiss. et A. Huet, 1856, in Boiss. Diagn. Pl. Or. Sér. 2, 3: 87.

Описан из Турции. Syn t y p i: «In ruderatis circa Erzeroum, Huet du Pavillon», «Circa Diarbekir Mesopotamiae, 1843, Kotschy» (G-BOISS; isosyntypi — ВМ, К).

ЮЗ: Ерев.

Указан для **ЮЗ:** Дар. (Назарова, 1995: 79).

Юго-Зап. Азия (Турция, сев. Сирия).

3 (1096). *C. pumilum* Jacq. 1771, Observ. Bot. 4: 3, tab. 80. — *C. divaricatum* Schousb. 1800, Lagttag. Vextr. Marokko: 197; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 716. — *C. intybus* L. var. *divaricatum* (Schousb.) DC. 1838, Prodr. 7: 84. — *C. endivia* L. var. *pumilum* (Jacq.) Vis. 1847, Fl. Dalm. 2: 97. — *C. endivia* L. subsp. *divaricatum* (Schousb.) P. D. Sell, 1976, Bot. Journ. Linn. Soc. (London), 71, 4: 240. — *C. endivia* L. subsp. *pumilum* (Jacq.) C. Jeffrey, 1979, Candollea, 34, 2: 309. — *C. glandulosum* auct. non Boiss. et A. Huet: Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 223; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 502; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 483.

* Ю. Л. Меницкий.

Описан из Юго-Восточной Европы.

ВЗ: Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ю. Караб. (Карягино).

Указан для **Т** (Цвелёв, 1964: 19).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Иран).

107 (217). *Koelpinia* Pall.

1 (1097). **K. linearis** Pall. 1776, Reise, 3, Anhang: 755. — *Rhagadiolus koelpinia* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1626. — *Koelpinia latifolia* C. Winkl. 1890, Тр. Петерб. бот. сада, 11, 5: 284.

Описан с Прикаспийской низменности («ad montem Bogdensem deserti Astrakanensis observata...»).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.;

ЮЗ: Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВК:** Кубин. (Карягин, 1961: 486); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Дар. (Назарова, 1995: 132).

Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

Subtrib. 3. *Scorzonerinae* Dumort.*

108 (218). *Scorzonera* L.

1 (1098). **S. filifolia** Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 774. — *S. rubriseta* Lipsky, 1891, Зап. Киев. общ. естествоисп. 11: 52. — *S. lipskyi* Lipsch. 1939, Фрагм. моногр. *Scorzonera*, 2: 15.

Описан из Дарестана. Syn t y p i: «In Caucasi orientalis Daghestania supra Gimri 3600' in rupestribus imperviis, Rupr.; in ditione Gumbet prope Danuch 5400', Owerin» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Эндемик.

2 (1099). **S. seidlitzii** Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 775; Камелин и Тагаев, 1986, Бот. журн. 71, 12: 1677; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 86; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 94.

Описан из Армении. T y p u s: «In alpinis Alagos Armeniae Rossicae cl. Nic. a Seidlitz» (G-BOISS).

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион. (Рача-Лечх.), Рион.-Квир., ? Адж.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (г. Тетроби), Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция, сев. Иран).

3 (1100). **S. charadzeae** Parava, 1955, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 18: 68; Камелин и Тагаев, 1986, Бот. журн. 71, 12: 1677; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 94. — *S. charadzeae* Parava var. *incanescens* (Sosn.) Kuth. 1970, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 28: 31. — *S. filifolia* Boiss. var. *incanescens* Sosn. 1947, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 13: 63, non Trautv. — *S. filifolia* Boiss. var. *vegetior* Sosn.

* Ш. И. Кутателадзе.