

Ю33: Месх.

Эндемик.

110 (220). *Epilasia* (Bunge) Benth.

1 (1138). **E. hemilasia** (Bunge) C. B. Clarke, 1876, Compos. Ind.: 279; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 111. — *Scorzonera hemilasia* Bunge, 1851, Beitr. Kenntn. Fl. Russl. Stepp. Centr.-As.: 201. — *S. cenopleura* Bunge, 1851, l. c.: 202. — *S. intermedia* Bunge, 1851, l. c.: 201–202. — *Epilasia cenopleura* (Bunge) C. B. Clarke, 1876, l. c.: 279. — *E. nana* (Boiss. et Buhse) Grossh. 1932, Бот. сборн. Азерб. ГНИИ, 1: 56.

Описан из Средней Азии. Т у р у s: «Am Ian-Darya, 3 V 1842, A. Lehmann» (LE!).

В3: Ширв.; **Ю3:** Нах.

Юго-Зап. (Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан), Ср., Центр. Азия.

111 (221). *Tragopogon* L.

1 (1139). **T. graminifolius** DC. 1838, Prodr. 7: 114; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 129; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 64. — *T. talyschense* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 137. — *T. caucasicus* auct. non Bess.: Fisch. et C. A. Mey. ex DC. 1838, l. c.: 114, pro syn. — *T. orientalis* auct. cauc. non L.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «In Imeretia, legit cl. Szovitz» (G-DC; isotypus — LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **Ю33:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан.

Указан для **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **Ю33:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар. (Назарова, 1995: 129).

Юго-Зап. (сев.-вост. Турция: бывш. Карсская обл.; Иран; Афганистан), Ср. Азия.

2 (1140). **T. brevirostris** DC. 1838, Prodr. 7: 114. — *T. caucasicus* Bess. ex DC. 1838, l. c.: 114, pro syn., non Fisch. et C. A. Mey. nec. Szovitz.

Описан по экземплярам, выращенным В. Г. Бессером из семян, присланных Х. Стевенем с Кавказа («ad Caucasum. *T. caucasum nobis*. e. semen Stev. cult. cremen, Herb. V. Bess»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.

Эндемик.

3 (1141). **T. serotinus** Sosn. 1951, в Кут. Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 16: 98; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 129; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 65. — *T. graminifolius* DC. subsp. *serotinus* (Sosn.) T. N. Poroва, 1972, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 311.

Описан из Центрального Закавказья. Т у р у s: «Тбилиси, около Ботанического сада, на каменистых местах, 6 VIII 1948, Sch. Kuthatheladze» (ТБИ!; isotypus — LE).