

30 (1168). **T. buphtalmoides** (DC.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 750; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 123. — *Scorzonera buphtalmoides* DC. 1838, Prodr. 7: 121. — *Tragopogon persicus* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 7: 4.

Описан из северной Сирии. Т у р у s: «Circa Aleppum, legit Aucher, exs. № 3533» (G-DC).

ЮЗ: Дар., Нах., Мерг.-Зан.

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Иран).

31 (1169). **T. tasch-kala** Kuth. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 38; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 123, pro syn. *T. buphtalmoides* (DC.) Boiss.

Описан из Армении. Т у р у s: «Армения, Карабари, Таш-кала, юго-зап. склон, 1750 м, 2 VII 1950, Ш. Асланян» (ТБИ!; isotypus — LE!).

ЮЗ: Ерев.

Эндемик.

Э. А. Назарова (1995, цит. соч.: 124) предположила, что правильное название населенного пункта — Караберд (Анийский р-н), а не Карабари.

32 (1170). **T. karjaginii** Kuth. 1957, Кавк. предст. Tragop.: 57.

Описан из Южного Закавказья. Т у р у s: «Azerbeidjan, Djebrail, 30 VI 1932, I. Karjagin» (BAK!).

ЮЗ: Ю.Караб.

Эндемик.

33 (1171). **T. armeniacus** Kuth. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 36; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 123.

Описан из Юго-Западного Закавказья. Т у р у s: «Армения, Артикский р-н, в 2-х км к юго-вост. от деревни Спандарчи, 1870 м, 7 VII 48, собр. Ш. Асланян» (ТБИ!; isotypus — LE!).

ЮЗЗ: Араг.

Эндемик.

34 (1172). **T. kemulariae** Kuth. 1953, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 17: 28; Rech. f. 1977, Fl. Iran. 122: 91; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 124; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 79.

Описан из Юго-Западного Закавказья. Т у р у s: «Джавахетия, между селами Бежано и Хумриси, 3 VII 1921, В. Козловский» (ТБИ!; isotypus — LE!).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мерг.-Зан.; ? **Т.**

Юго-Зап. Азия (Иран).

112 (222). **Geropogon** L.

1 (1173). **G. hybridus** (L.) Sch. Bip. 1850, in Webb et Berthel. Phytogr. Canar. 2: 471; Цвел. 1989, Фл. европ. части СССР, 8: 57; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 81. — *Tragopogon hybridum* L. 1753, Sp. Pl.: 789. — *Geropogon glabrum* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1109; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 744; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 233; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 507. — *G. hirsutum* L. 1763, l. c.: 1109.

Описан из Италии.

ВЗ: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **Т.**

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Subtrib. 4. **Нypochoerinae** Less.

113 (223). **Нypochoeris** L.*

1 (1174). **H. radicata** L. 1753, Sp. Pl.: 811.

Описан из Европы.

ЗЗ.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

114 (224). **Trommsdorffia** Bernh.*

1 (1175). **T. maculata** (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 102. — *Hypochoeris maculata* L. 1753, Sp. Pl.: 810. — *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2: 116, nom. illeg.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. Азия.

115 (225). **Leontodon** L.*

1 (1176). **L. autumnalis** L. 1753, Sp. Pl.: 798.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 241).

Европа; Сев., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1177). **L. hispidus** L. aggr.

2а. **L. caucasicus** (Bieb.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 34. — *Apargia caucasica* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 2: 247.

Описан с Центрального Кавказа («in alpe Kaischaur»). Lectotypus (Geltman, hoc loco): «Kobi, a. 1805, Bieb.» (LE!).

ЗП: З. Ставр. (гора Стрижамент); **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Мерп.-Зан.; **Т.**

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия.

2б. **L. danubialis** Jacq. 1762, Enum. Stirp. Vindob.: 139, 270. — *L. hastilis* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1123. — *L. hispidus* L. var. *glabratus* (W. D. J. Koch) Bisch. 1851, Beitr. Fl. Deutschl.: 59.

Описан из Европы (острова Дуная).

* Д. В. Гельтман.