

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Subtrib. 4. **Нypochoerinae** Less.

113 (223). **Нypochoeris** L.*

1 (1174). **H. radicata** L. 1753, Sp. Pl.: 811.

Описан из Европы.

ЗЗ.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

114 (224). **Trommsdorffia** Bernh.*

1 (1175). **T. maculata** (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 102. — *Hypochoeris maculata* L. 1753, Sp. Pl.: 810. — *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2: 116, nom. illeg.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. Азия.

115 (225). **Leontodon** L.*

1 (1176). **L. autumnalis** L. 1753, Sp. Pl.: 798.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 241).

Европа; Сев., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1177). **L. hispidus** L. aggr.

2а. **L. caucasicus** (Bieb.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 34. — *Apargia caucasica* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 2: 247.

Описан с Центрального Кавказа («in alpe Kaischaur»). Lectotypus (Geltman, hoc loco): «Kobi, a. 1805, Bieb.» (LE!).

ЗП: З. Ставр. (гора Стрижамент); **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Мерп.-Зан.; **Т.**

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия.

2б. **L. danubialis** Jacq. 1762, Enum. Stirp. Vindob.: 139, 270. — *L. hastilis* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1123. — *L. hispidus* L. var. *glabratus* (W. D. J. Koch) Bisch. 1851, Beitr. Fl. Deutschl.: 59.

Описан из Европы (острова Дуная).

* Д. В. Гельтман.