

Атл., Южн. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран).

Subtrib. 4. **Нypochoerinae** Less.

113 (223). **Нypochoeris** L.*

1 (1174). **H. radicata** L. 1753, Sp. Pl.: 811.

Описан из Европы.

ЗЗ.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия; Сев., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

114 (224). **Trommsdorffia** Bernh.*

1 (1175). **T. maculata** (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 102. — *Hypochoeris maculata* L. 1753, Sp. Pl.: 810. — *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2: 116, nom. illeg.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Атл., Сев., Центр., Южн., Вост. Европа; Сев. Азия.

115 (225). **Leontodon** L.*

1 (1176). **L. autumnalis** L. 1753, Sp. Pl.: 798.

Описан из Европы.

ЗП: З. Ставр.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 241).

Европа; Сев., Вост. (заносное) Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1177). **L. hispidus** L. aggr.

2а. **L. caucasicus** (Bieb.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 34. — *Apargia caucasica* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Саус. 2: 247.

Описан с Центрального Кавказа («in alpe Kaischaur»). Lectotypus (Geltman, hoc loco): «Kobi, a. 1805, Bieb.» (LE!).

ЗП: З. Ставр. (гора Стрижамент); **ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Мерп.-Зан.; **Т.**

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия.

2б. **L. danubialis** Jacq. 1762, Enum. Stirp. Vindob.: 139, 270. — *L. hastilis* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 1123. — *L. hispidus* L. var. *glabratus* (W. D. J. Koch) Bisch. 1851, Beitr. Fl. Deutschl.: 59.

Описан из Европы (острова Дуная).

* Д. В. Гельтман.

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх. Атл., Центр., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

2с. **L. hispidus** L. 1753, Sp. Pl.: 799.

Описан из Европы.

ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Дар.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

3 (1178). **L. biscutellifolius** DC. 1838, Prodr. 7, 1: 103. — *Apargia aspera* Waldst. et Kit. 1805, Pl. Rar. Hung. 2: 114, tab. 110. — *Leontodon asper* (Waldst. et Kit.) Poir. 1814, in Lam. et Poir. Encycl. Méth. Bot. Suppl. 3: 453; Ball, 1850, Ann. Mag. Nat. Hist. (London), ser. 2, 6, 31: 14, cum auct. comb. Rchb.; В. Н. Васил. 1964, Фл. СССР, 29: 215 («*asperus*»), cum auct. comb. Boiss. non Forssk. 1775. — *L. crispus* Vill. subsp. *asper* (Waldst. et Kit.) Rohlena, 1912, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss.: 67.

Описан по материалам из Италии и Крыма.

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб. (Галушко, 1980: 240).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

4 (1179). **L. kotschyi** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 11: 40. — *L. talyschensis* Askerova, 1959, Докл. АН АзербССР, 15, 6: 527.

Описан из Ирана. Турus: «In m. Demawend, alt. 6600', 21 VI 1843, Th. Kotschy» (G; isotypus — LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

5 (1180). **L. asperrimus** (Willd.) Ball, 1850, Ann. Mag. Nat. Hist. (London), ser. 2, 6, 31: 15. — *Scorzonera asperrima* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1507.

Описан из Турции.

ВК: Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Указание для **ЗК:** Кубин. и **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 240), скорее всего, ошибочно.

116 (226). **Picris** L.*

1 (1181). **P. hieracioides** L. aggr.

1а. **P. hieracioides** L. 1753, Sp. Pl.: 792.

Описан из Европы.

* Д. В. Гельтман.