

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх. Атл., Центр., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

2с. **L. hispidus** L. 1753, Sp. Pl.: 799.

Описан из Европы.

ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Дар.

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

3 (1178). **L. biscutellifolius** DC. 1838, Prodr. 7, 1: 103. — *Apargia aspera* Waldst. et Kit. 1805, Pl. Rar. Hung. 2: 114, tab. 110. — *Leontodon asper* (Waldst. et Kit.) Poir. 1814, in Lam. et Poir. Encycl. Méth. Bot. Suppl. 3: 453; Ball, 1850, Ann. Mag. Nat. Hist. (London), ser. 2, 6, 31: 14, cum auct. comb. Rchb.; В. Н. Васил. 1964, Фл. СССР, 29: 215 («*asperus*»), cum auct. comb. Boiss. non Forssk. 1775. — *L. crispus* Vill. subsp. *asper* (Waldst. et Kit.) Rohlena, 1912, Sitzungsber. Böhm. Ges. Wiss.: 67.

Описан по материалам из Италии и Крыма.

ЗК: В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб. (Галушко, 1980: 240).

Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

4 (1179). **L. kotschyi** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 11: 40. — *L. talyschensis* Askerova, 1959, Докл. АН АзербССР, 15, 6: 527.

Описан из Ирана. Турus: «In m. Demawend, alt. 6600', 21 VI 1843, Th. Kotschy» (G; isotypus — LE!).

Т.

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

5 (1180). **L. asperrimus** (Willd.) Ball, 1850, Ann. Mag. Nat. Hist. (London), ser. 2, 6, 31: 15. — *Scorzonera asperrima* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1507.

Описан из Турции.

ВК: Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

Указание для **ЗК:** Кубин. и **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 240), скорее всего, ошибочно.

116 (226). **Picris** L.*

1 (1181). **P. hieracioides** L. aggr.

1а. **P. hieracioides** L. 1753, Sp. Pl.: 792.

Описан из Европы.

* Д. В. Гельтман.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг. Атл., Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

1b. **P. rigida** Ledeb. ex Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 663.

Описан из Крыма. Т у р у s: «Tauria, ad radicem m. Agarmysch, a. 1818» (LE!).

ЗП; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан. Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (1182). **P. pauciflora** Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1557.

Описан из Франции.

ЗП: Аз.-Куб. (Новопокровский р-н, с. Белая Глина); **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 241);

ЮЗЗ: Месх. (Мцхетадзе, 2003: 59); **ЮЗ:** Дар., Занг. (Назарова, 1995: 138).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

3 (1183). **P. strigosa** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 250.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у s: «Beschbarmak, Ваку, 2 VII 1830, Bieb.» (LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК;** **ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1982: 85).

? Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

4 (1184). **P. canescens** (Steven) V. N. Vassil. 1964, Фл. СССР, 29: 227. — *Hypochaeris canescens* Steven, 1816, Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 100. — *Picris laevis* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 59. — *P. strigosa* Bieb. subsp. *canescens* (Steven) Lack, 1975, Diss. Univ. Wien, 116: 111.

Описан с Северного Кавказа. Т у р у s: «Caucas, a. 1816, Steven» (LE — Herb. Bieb.).

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., **ЗК:** Уруп-Теб. В. Куб.; **ВК:** В. Сулак.; Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 241).

Юго-Зап. Азия (зап. Иран).

Очень близок к предыдущему виду.

117 (227). *Helminthotheca* L. Vaill. ex Zinn*

1 (1185). **H. echioides** (L.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8, 2: 176. — *Picris echioides* L. 1753, Sp. Pl.: 792. — *Helminthia echioides* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 368.

Описан по материалам из Англии и Франции.

* Д. В. Гельтман.