

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг. Атл., Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

1b. **P. rigida** Ledeb. ex Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 663.

Описан из Крыма. Т у р у s: «Tauria, ad radicem m. Agarmysch, a. 1818» (LE!).

ЗП; ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан. Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (1182). **P. pauciflora** Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1557.

Описан из Франции.

ЗП: Аз.-Куб. (Новопокровский р-н, с. Белая Глина); **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 241); **ЮЗЗ:** Месх. (Мцхетадзе, 2003: 59); **ЮЗ:** Дар., Занг. (Назарова, 1995: 138). Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия.

3 (1183). **P. strigosa** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 250.

Описан с Восточного Кавказа. Т у р у s: «Beschbarmak, Ваку, 2 VII 1830, Bieb.» (LE!).

ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ВК; ЗЗ:** Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ; ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Абх. (Колаковский, 1982: 85).

? Вост. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

4 (1184). **P. canescens** (Steven) V. N. Vassil. 1964, Фл. СССР, 29: 227. — *Hypochaeris canescens* Steven, 1816, Mém. Soc. Nat. Moscou, 4: 100. — *Picris laevis* C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 59. — *P. strigosa* Bieb. subsp. *canescens* (Steven) Lack, 1975, Diss. Univ. Wien, 116: 111.

Описан с Северного Кавказа. Т у р у s: «Caucas, a. 1816, Steven» (LE — Herb. Bieb.).

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., **ЗК:** Уруп-Теб. В. Куб.; **ВК:** В. Сулак.; Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Галушко, 1980: 241).

Юго-Зап. Азия (зап. Иран).

Очень близок к предыдущему виду.

117 (227). *Helminthotheca* L. Vaill. ex Zinn*

1 (1185). **H. echioides** (L.) Holub, 1973, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 8, 2: 176. — *Picris echioides* L. 1753, Sp. Pl.: 792. — *Helminthia echioides* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 368.

Описан по материалам из Англии и Франции.

* Д. В. Гельтман.

ЗП: З. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 242).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев., Центр., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

118 (228). *Urospermum* Scop.*

1 (1186). **U. picroides** (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, 1795, Samml. Phys.-Ökon. Aufs. 1: 276. — *Tragopogon picroides* L. 1753, Sp. Pl.: 790. — *Arnopogon picroides* (L.) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1496. — *Urospermum asperum* (L.) DC. 1805, Fl. Fr. ed. 3, 4, 1: 63.

Описан из Средиземноморья (о. Крит).

ВЗ: Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Назарова, 1995: 140).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Иран).

Указания для **ЗЗ:** Абх., Адж. (Гроссгейм, 1934: 226; Кутателадзе, 1952: 606) сомнительны.

119 (229). *Hedynois* Mill.*

1 (1187). **H. cretica** (L.) Dum. Cours. 1802, Bot. Cult. 2: 339; Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1617. — *Hyoseris cretica* L. 1753, Sp. Pl.: 810. — *H. hedynois* L. 1753, l. c.: 809. — *Rhagadiolus hedynois* (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 226. — *Hedynois persica* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 539; Васс. 1964, Фл. СССР, 29: 230. — *H. polymorpha* DC. 1838, Prodr. 7: 81.

Описан из Средиземноморья (о. Крит).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **Т** (Гроссгейм, 1934: 225; Алиев, 1961: 490).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран).

120 (230). *Garhadiolus* Jaub. et Spach*

1 (1188). **G. angulosus** Jaub. et Spach, 1850, Ill. Pl. Or. 3: 122. — *G. hedynois* Jaub. et Spach, 1850, l. c.: 120; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 723; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 225; Сахок. 1952, Фл. Груз. 8: 605; Алиев, 1961, Фл. Азерб. 8: 491, non *Rhagadiolus hedynois* (L.) All. 1785. — *Rhagadiolus angulosus* (Jaub. et Spach) Kupicha, 1975, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33: 433; ead. 1975, Fl. Turk. 5: 688. — *R. hedynois* auct. non All.: Fisch. et C. A. Mey. 1838, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 46; iid. ex DC. 1838, Prodr. 7: 78.

Описан по материалам из Сирии и Турции. *Syn typi*: «Halep, Oliver; Bruguière; Aintab, № 3448, Aucher» (P?).

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, зап. Сирия, сев. Ирак, сев. Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

* Ю. Л. Меницкий.