

**ЗП:** З. Ставр.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 242).

Атл., Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев., Центр., Южн. Америка (заносное); Австралия (заносное).

### 118 (228). *Urospermum* Scop.\*

1 (1186). **U. picroides** (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, 1795, Samml. Phys.-Ökon. Aufs. 1: 276. — *Tragopogon picroides* L. 1753, Sp. Pl.: 790. — *Arnopogon picroides* (L.) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1496. — *Urospermum asperum* (L.) DC. 1805, Fl. Fr. ed. 3, 4, 1: 63.

Описан из Средиземноморья (о. Крит).

**ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Назарова, 1995: 140).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Иран).

Указания для **ЗЗ:** Абх., Адж. (Гроссгейм, 1934: 226; Кутателадзе, 1952: 606) сомнительны.

### 119 (229). *Hedynois* Mill.\*

1 (1187). **H. cretica** (L.) Dum. Cours. 1802, Bot. Cult. 2: 339; Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1617. — *Hyoseris cretica* L. 1753, Sp. Pl.: 810. — *H. hedynois* L. 1753, l. c.: 809. — *Rhagadiolus hedynois* (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 1: 226. — *Hedynois persica* Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 539; Васс. 1964, Фл. СССР, 29: 230. — *H. polymorpha* DC. 1838, Prodr. 7: 81.

Описан из Средиземноморья (о. Крит).

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **Т** (Гроссгейм, 1934: 225; Алиев, 1961: 490).

Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, зап. Иран).

### 120 (230). *Garhadiolus* Jaub. et Spach\*

1 (1188). **G. angulosus** Jaub. et Spach, 1850, Ill. Pl. Or. 3: 122. — *G. hedynois* Jaub. et Spach, 1850, l. c.: 120; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 723; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 225; Сахок. 1952, Фл. Груз. 8: 605; Алиев, 1961, Фл. Азерб. 8: 491, non *Rhagadiolus hedynois* (L.) All. 1785. — *Rhagadiolus angulosus* (Jaub. et Spach) Kupicha, 1975, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 33: 433; ead. 1975, Fl. Turk. 5: 688. — *R. hedynois* auct. non All.: Fisch. et C. A. Mey. 1838, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 46; iid. ex DC. 1838, Prodr. 7: 78.

Описан по материалам из Сирии и Турции. *Syn typi*: «Halep, Oliver; Bruguière; Aintab, № 3448, Aucher» (P?).

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. (Турция, зап. Сирия, сев. Ирак, сев. Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

---

\* Ю. Л. Меницкий.

2 (1189). **G. papposus** Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 135. — *Rhagadiolus papposus* (Boiss. et Buhse) Kuntze, 1887, Тр. Петерб. бот. сада, 10: 205; Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 689.

Описан из Южного Закавказья. Турус: «Bei Nachitschewan an durren Orten, V 1847, № 237, Buhse» (G).

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 242); **ЮЗ**: Ерев. (Назарова, 1995: 142), Нах. (Алиев, 1961: 492).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

### 121 (231). *Rhagadiolus* Scop.\*

1 (1190). **R. edulis** Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 354. — *Lampsana rhagadiolus* L. 1753, Sp. Pl.: 812. — *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 354; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 43. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *edulis* (Gaertn.) DC. 1838, Prodr. 7: 77; Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 688.

Описан с «Востока».

**ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан. (во всех районах заносное). Средиз.; Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1191). **R. hebelaenus** (DC.) Vass. 1964, Фл. СССР, 29: 234. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *hebelaenus* DC. 1838, Prodr. 7: 78; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 722. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *stellatus* Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 687. — *R. edulis* auct. non Gaertn.: Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 224, р. р.; Кут. 1952, Фл. Груз. 8: 602; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 487.

Описан из Греции.

**БК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Карягин, 1961: 487).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

### Subtrib. 5. *Lactucinae* Less.

#### 122 (232). *Sonchus* L.\*

1 (1192). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 793. — *S. uliginosus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Sauc. 2: 238. — *S. ketzkhovellii* Schchian, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 71; Лач. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 140.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ВП**: В. Ставро.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **БК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Севан.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 248); **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Шхиян, 1952: 677); **ЮЗ**: Ерев. (Гроссгейм, 1934: 254).

\* Ю. Л. Меницкий.