

2 (1189). **G. papposus** Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 135. — *Rhagadiolus papposus* (Boiss. et Buhse) Kuntze, 1887, Тр. Петерб. бот. сада, 10: 205; Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 689.

Описан из Южного Закавказья. Туркус: «Bei Nachitschewan an durren Orten, V 1847, № 237, Buhse» (G).

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **БК**: Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 242); **ЮЗ**: Ерев. (Назарова, 1995: 142), Нах. (Алиев, 1961: 492).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср. Азия.

### 121 (231). *Rhagadiolus* Scop.\*

1 (1190). **R. edulis** Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 354. — *Lampsana rhagadiolus* L. 1753, Sp. Pl.: 812. — *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 354; Кут. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 43. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *edulis* (Gaertn.) DC. 1838, Prodr. 7: 77; Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 688.

Описан с «Востока».

**ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан. (во всех районах заносное). Средиз.; Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

2 (1191). **R. hebelaenus** (DC.) Vass. 1964, Фл. СССР, 29: 234. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *hebelaenus* DC. 1838, Prodr. 7: 78; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 722. — *R. stellatus* (L.) Gaertn. var. *stellatus* Купича, 1975, Fl. Turk. 5: 687. — *R. edulis* auct. non Gaertn.: Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 224, р. р.; Кут. 1952, Фл. Груз. 8: 602; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 487.

Описан из Греции.

**БК**: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ**: Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ**: Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВЗ**: Иорск.-Шек. (Карягин, 1961: 487).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

### Subtrib. 5. *Lactucinae* Less.

#### 122 (232). *Sonchus* L.\*

1 (1192). **S. arvensis** L. 1753, Sp. Pl.: 793. — *S. uliginosus* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Sauc. 2: 238. — *S. ketzkhovellii* Schchian, 1949, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 15: 71; Лач. 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 140.

Описан из Европы.

**ЗП**; **ВП**: В. Ставро.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК**: В. Кум., Малк.; **БК**: В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Севан.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 248); **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах. (Шхиян, 1952: 677); **ЮЗ**: Ерев. (Гроссгейм, 1934: 254).

\* Ю. Л. Меницкий.

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; заносное по всей Азии, Америке, Африке и Австралии.

2 (1193). **S. palustris** L. 1753, Sp. Pl.: 793.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 248); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Шхиян, 1952: 677; Лачашвили, 2003: 140), Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1934: 254; Лачашвили, 2003: 140); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Лачашвили, 2003: 140); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1934: 254).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

3 (1194). **S. transcaspicus** Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 4: 293. — *S. maritimus* auct. non L.: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 797.

Описан из Средней Азии.

Указан для **ЮЗ:** Мерг.-Зан. (Шхиян, 1949: 71; Назарова, 1995: 150).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

4 (1195). **S. asper** (L.) Hill, 1769, Herb. Brit. 1: 47. — *S. oleraceus* L. var. *asper* L. 1753, Sp. Pl.: 794.

Описан из Европы.

**ЗП;** **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1934: 254; Кирпичников, 1964: 259).

Европа; Азия; заносное во всех частях света.

5 (1196). **S. oleraceus** L. 1753, Sp. Pl.: 794.

Описан из Европы.

**ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1934: 254; Кирпичников, 1964: 255).

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; заносное почти по всему земному шару.

М. Э. Кирпичников (1964: 260), видевший аутентичный материал *S. eryngiifolius* Sosn. 1934, в Гроссг. Фл. Кавк. 4: 254 (ВК: В. Сулак.), считает его гибридом *S. asper* (L.) Hill × *S. oleraceus* L.

### 123 (233). **Reichardia** Roth\*

1 (1197). **R. glauca** V. A. Matthews, 1975, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 34: 125. — *Sonchus dichotomus* (Vahl) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1517, p. p., excl. typo. — *Picridium*

\* Ю. Л. Меницкий.