

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; заносное по всей Азии, Америке, Африке и Австралии.

2 (1193). **S. palustris** L. 1753, Sp. Pl.: 793.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 248); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Шхиян, 1952: 677; Лачашвили, 2003: 140), Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1934: 254; Лачашвили, 2003: 140); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Лачашвили, 2003: 140); **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1934: 254).

Европа; Сев., Юго-Зап. (Турция), Ср., Центр. Азия.

3 (1194). **S. transcaspicus** Nevski, 1937, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 4: 293. — *S. maritimus* auct. non L.: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 797.

Описан из Средней Азии.

Указан для **ЮЗ:** Мерг.-Зан. (Шхиян, 1949: 71; Назарова, 1995: 150).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

4 (1195). **S. asper** (L.) Hill, 1769, Herb. Brit. 1: 47. — *S. oleraceus* L. var. *asper* L. 1753, Sp. Pl.: 794.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1934: 254; Кирпичников, 1964: 259).

Европа; Азия; заносное во всех частях света.

5 (1196). **S. oleraceus** L. 1753, Sp. Pl.: 794.

Описан из Европы.

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1934: 254; Кирпичников, 1964: 255).

Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; заносное почти по всему земному шару.

М. Э. Кирпичников (1964: 260), видевший аутентичный материал *S. eryngiifolius* Sosn. 1934, в Гроссг. Фл. Кавк. 4: 254 (ВК: В. Сулак.), считает его гибридом *S. asper* (L.) Hill × *S. oleraceus* L.

123 (233). **Reichardia** Roth*

1 (1197). **R. glauca** V. A. Matthews, 1975, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 34: 125. — *Sonchus dichotomus* (Vahl) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1517, p. p., excl. typo. — *Picridium*

* Ю. Л. Меницкий.

dichotomum (Vahl) Fisch. et C. A. Mey. 1838, in DC. Prodr. 7:183, p. p., excl. typo. — *Reichardia dichotoma* (Vahl) Freyn, 1892, Österr. Bot. Zeitschr. 42: 267, p. p., excl. typo. — *Scorzonera dichotoma* auct. non Vahl, 1791, Symb. Bot. 2: 89, nom. illeg.

Описан из Турции. Т у р у s: «Zonguldak, Karabük to Keltepe, 850 m, bare banks, 3 VIII 1962, № 38841, Davis a. Coode» (E).

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрч., Ширв., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах.

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 248); **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори (Гроссгейм, 1934: 259; Лачашвили, 2003: 161); **ВЗ:** Иорск.-Шек. (Карягин, 1961: 562); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах. (Шхиян, 1952: 694; Лачашвили, 2003: 161).

Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ливан).

124 (234). *Prenanthes* L.*

1 (1198). **P. abietina** (Boiss. et Bal.) Kirp. 1964, Фл. СССР, 29: 270. — *Mulgedium abietinum* Boiss. et Bal. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 802. — *Lactuca abietina* (Boiss. et Bal.) Bornm. 1905, Mitt. Thüring. Bot. Ver. n. s. 20: 25. — *Crepis abietina* (Boiss. et Bal.) Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 2: 115. — *Cicerbita abietina* (Boiss. et Bal.) Beauverd, 1934, в Гросср. Фл. Кавк. 4: 252.

Описан из Турции. Т у р у s: «Circa Khabackar Ponti Lazici, 2000 m, Balansa» (K).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрч.

Указан для **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт. (Гагнидзе, 2003: 178).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

2 (1199). **P. petiolata** (C. Koch) Sennikov, 1997, Бот. журн. 82, 2: 113. — *Mulgedium petiolatum* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 279. — *M. cacaliifolium* (Bieb.) DC. 1838, Prodr. 7: 250, p. p. — *M. ponticum* Boiss. 1854, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 4, 2: 248. — *M. cacaliifolium* (Bieb.) DC. var. *minus* Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 801. — *Prenanthes cacaliifolia* (Bieb.) Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 2: 115. — *P. pontica* (Boiss.) Leskov, 1932, Тр. Бот. муз. АН СССР, 25: 44. — *Cicerbita cacaliifolia* (Bieb.) Beauverd, 1934, в Гросср. Фл. Кавк. 4: 253, excl. typo. — *C. pontica* (Boiss.) Grossh. 1934, цит. соч.: 253. — *C. petiolata* (C. Koch) Gagnidze, 1965, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 25: 56.

Описан из Грузии. Л е c t o т y п u s (Сенников, 1997: 113): «In montibus Nakerala, in Imeretia, 1836, № 1146, legit Dr. Koch» (manus C. A. Meyeri) (LE!).

ЗК: Адаг.-Пшиш, Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Асо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

3 (1200). **P. purpurea** L. 1753, Sp. Pl.: 797. — *P. tenuifolia* L. 1753, l. c.: 797.

Описан из Европы («in Hermaniae, Helvetiae, Italiae nemoribus montanis»). Л е c t o т y п u s (Jeffrey, 1975: 766): ВМ — Herb. Cliff.

* А. Н. Сенников.