

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Ирак, Иран); заносное в Сев. и Южн. Америке.

8 (1208). **L. georgica** Grossh. 1924, in Grossh. et Schischk. Sched. Herb. Pl. Or. Exs. 1–8: 8; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 257.

Описан из Грузии. Тур у s: «Transcaucasia, pr. et distr. Tiflis, prope ruinas Ker-Ogly, 4000', in lapidosis, 6 VIII 1922, A. Grossheim» (ТВИ; isotypus — LE!).

ВК: Ман.-Самур; **ЗЗ:** Адж.; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Дар., Нах.; **Т.**

Указан для **ВК:** Кубин. (Аскерова, 1961: 554); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. (Мцхетадзе, 2003: 151); **ЮЗ:** Севан., Занг. (Назарова, 1995: 174).

Юго-Зап. (Турция), Ср. (Туркмения) Азия.

Sect. 2. *Micranthae* Boiss.

9 (1209). **L. undulata** Ledeb. 1830, Icon. Pl. Fl. Ross. 2: 12, tab. 129; id. 1833, Fl. Alt. 4: 156. — *Lactucella undulata* (Ledeb.) Nazarova, 1990, Биол. журн. Арм. 3: 181; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 178.

Описан из Казахстана.

ЮЗ: Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Ерев., Севан. (Гроссгейм, 1934: 255; Назарова, 1995: 178).

Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

126 (236). *Scariola* F. W. Schmidt*

1 (1210). **S. viminea** (L.) F. W. Schmidt, 1795, Samml. Phys-Ökon Aufs. 1: 270. — *Prenanthes viminea* L. 1753, Sp. Pl.: 797; Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 244. — *Lactuca viminea* (L.) J. et C. Presl, 1819, Fl. Čech.: 160; Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 819; Шмальг. 1897, Фл. Средн. и Южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 2: 169; Гроссг. 1934, Фл. Кавк. 4: 256; он же, 1949, Определ. раст. Кавк.: 516; Шхиян, 1952, Фл. Груз. 8: 691; Аскерова, 1961, Фл. Азерб. 8: 556; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 307; Гагнидзе и Кем.-Нат. 1985, Бот. геогр. фл. Рача-Лечх.: 68; Мцхетадзе, 2003, Фл. Груз. изд. 2, 14: 154. — *Phoenixopus vimineus* (L.) Rchb. 1831, Fl. Germ. Exkurs. 2: 272; Сосн. 1946, в Тахт. и Фёд. Фл. Ерев.: 335. — *Phaenopus vimineus* (L.) DC. 1838, Prodr. 7: 176.

Описан из Европы.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах.

Указан для **ЗП;** **ВП** (Гроссгейм, 1949: 516); **ЗЗ:** Инг.-Рион. (Гагнидзе, Кемуляри-Натадзе, 1975: 68; Мцхетадзе, 2003: 155); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Занг., Мегр.-Зан.; **Т** (Гроссгейм, 1934: 256, 1949: 516; Шхиян, 1952: 691; Аскерова, 1961: 556; Тахтаджян, Фёдоров, 1972: 307; Назарова, 1995: 182; Мцхетадзе, 2003: 155).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (Турция, Ирак, Иран), Ср. Азия.

* Ю. Л. Меницкий.

2 (1211). **S. orientalis** (Boiss.) Soják, 1962, Novit. Bot. Prag.: 46. — *Phaenopus orientalis* Boiss. 1839, Voy. Bot. Espagne, 2: 390. — *Lactuca viminea* (L.) J. et C. Presl var. *leucocarpa* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 559. — *L. orientalis* (Boiss.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 819; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 256; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 516; Аскерова, 1961, Фл. Азерб. 8: 556; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 307.

Описан по материалам из Ирана, Ливана и с Синайского п-ова.

ЮЗ: Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ЮЗЗ:** Араг. (Назарова, 1995: 182).

Юго-Зап. (Турция, Сирия, Ливан, Синайский п-ов, Иран), Ср., Центр. (Тибет) Азия.

127 (237). **Steptorhamphus** Bunge*

1 (1212). **S. crambifolius** Bunge, 1851, Beitr. Kenntn. Fl. Russl. Stepp. Centr.-As.: 205. — *Lactuca crambifolia* (Bunge) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 806. — *Cicerbita crambifolia* (Bunge) Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 2: 143. — *Lactuca edelbergii* Rech. f. 1955, Kong. Danske Vid. Selsk. Biol. Skr. 8, 2: 205. — *Steptorhamphus czerepanovii* Kirp. 1963, Бот. мат. (Ленинград), 22: 322; Кирп. 1964, Фл. СССР, 29: 334; Назарова, 1995, Фл. Арм. 9: 168.

Описан из Средней Азии. T u r u s: «In den Felsspalten des Tiumen-bei-tau, Lehmann» (LE!).

ЮЗ: Нах.

Указан для **ЮЗ:** Севан., Дар. (Назарова, 1995: 168).

? Юго-Зап. (Афганистан), Ср. Азия.

2 (1213). **S. persicus** (Boiss.) O. et B. Fedtsch. 1911, Переч. раст. Турк. 4: 319. — *Lactuca persica* Boiss. 1846, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 7: 9. — *Cicerbita persica* (Boiss.) Beauverd, 1910, Bull. Soc. Bot. Genève, Sér. 2, 2: 142.

Описан из Ирана («In Persia australi in rupestribus montis Kuh-Ajub prope Persepolim»).

ЮЗЗ: Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.

Юго-Зап., Ср. Азия.

3 (1214). **S. tuberosus** (Jacq.) Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4: 258. — *Lactuca tuberosa* Jacq. 1770, Hort. Bot. Vindob. 1: 18, tab. 47. — *L. petraea* Fisch. et C. A. Mey. ex DC. 1838, Prodr. 7: 134. — *Steptorhamphus petraeus* (Fisch. et C. A. Mey. ex DC.) Grossh. 1934, цит. соч.: 258.

Описан по культивируемым образцам. L e c t o t u r u s (Конечная, 1989: 126): Jacq. 1770, l. c.: tab. 47.

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Указан для **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек. (Алиев, 1961: 557); **ЮЗ:** Ерев., Дар., Занг., Мегр.-Зан. (Назарова, 1995: 168).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

* А. Н. Сенников.